

Վ. Մ. ՍԱՖՐԱՉԲԵԿՅԱՆ
Ա.Վ. ՄԱՆԱՍՅԱՆ

ԴԵՂԱՏՈՄՍԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ



Վ. Մ. ՍԱՖՐԱՉԲԵԿՅԱՆ
Ա.Վ. ՄԱՆԱՍՅԱՆ

ԴԵՂԱՏՈՄՍԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ

Գյուղատնտեսական կենդանիների
մարսողական համակարգի
ոչ վարակիչ հիվանդությունների բուժման
դեղատոմսեր

*ՀԳԱ անասնաբուժական բժշկագիտության
ֆակուլտետի ուսանողների համար*

ԵՐԵՎԱՆ-2003

ՀՏԴ - 619(03)
ԳՍԴ - 48 ց 2
Ս - 305

*Գատագիրքը հրատարակվել է
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՄԸԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ
գիտական խորհրդի որոշմամբ*

Վ. Մ. ՍԱՖՐԱԶԲԵԿՅԱՆ, Ա.Վ. ՄԱՆԱՍՅԱՆ
Ս - 305 Դեղատոմսերի տեղեկատու: Գյուղատնտեսական կենդանիների
մարսողական համակարգի ոչ վարակիչ հիվանդությունների
բուժում: (Անասնաբուժական բժշկագիտության
ֆակուլտետի ուսանողների համար).-Եր., 2003, 72 էջ:

ԳՍԴ - 619(03)

ISBN - 99941-908-3-0

© Վ. Մ. ՍԱՖՐԱԶԲԵԿՅԱՆ, Ա.Վ. ՄԱՆԱՍՅԱՆ

Անասնապահության լայն զարգացման հեռանկարները մեծ պահանջներ են ներկայացվում անասնաբուժական քննազմատի աշխատողներին:

Ներկա պայմաններում նրանք պետք է փեղյակ լինեն գիտության նվաճումներին և ժամանակակից պրակտիկայի մեթոդներին, որոնք կիրառվում են բուժական և կանխարգելման աշխատանքներում, հստակապես ֆարմակոդինամիկայի հարցերի լուծման ժամանակ:

Այս ներգործության հաջողությունը կախված է թե բժշկի հմտությունից, և թե հարուստ դեղանյութերից, որոնց խելացի ընտրությունը և համապեղությունը քարջրացնում է բուժման էֆեկտիվությունը:

Հուսով եմ, որ մեր կողմից ներկայացված դեղատոմսերի փեղեկագրուն, որպես քավականաչափ ընտրության հնարավորություն կա, կծառայի սպանդանաղիքային ուղու որոշ ոչ վարակիչ հիվանդությունների բուժման նպատակին, և կնպաստի հիվանդ կենդանու արագ ապաքինմանը:

*Հեղինակներ՝
Վ. Մ. ՍԱՖՐԱԶԲԵԿՅԱՆ
Ա. Վ. ՄԱՆԱՍՅԱՆ*

ՔԱՂՎԱԾՔ

Անասնաբուժական բժշկագիտության ֆակուլտետի մեթոդխորհրդի հունիսի 2002թ. 18-ի թիվ 8 նիստի արձանագրությունից

Օրակարգ

Ներքին ոչ վարակիչ հիվանդությունների, կլինիկական ախտորոշաբանության եւ դեղաբանության ամբիոնի պրոֆեսորներ Վ. Մ. Սաֆրազբեկյանի եւ Ա. Վ. Մանասյանի կողմից կազմված «Գյուղատնտեսական կենդանիների մարսողական համակարգի ոչ վարակիչ հիվանդությունների բուժման դեղատոմսեր» տեղեկատուի քննարկման եւ տպագրության երաշխավորելու հարցը:

Լսեցին

Մեթոդխորհրդի նախագահ, պրոֆեսոր Ա. Վ. Մանասյանը ներկայացրեց տպագրության պատրաստվող պրոֆեսոր Վ. Մ. Սաֆրազբեկյանի եւ իր կողմից կազմված «Գյուղատնտեսական կենդանիների մարսողական համակարգի ոչ վարակիչ հիվանդությունների բուժման դեղատոմսեր» գլխագրով տեղեկատուն, ներկայացրեց աշխատանքի վերաբերյալ ԶԳԱ-ի համաճարակաբանության եւ մակաբուժաբանության ամբիոնի վարիչ, ա.գ.դ., պրոֆեսոր Ս. Լ. Գրիգորյանի, նույն ամբիոնի մակաբուժաբանության սեկտորի վարիչ, ա.գ.դ. Գ. Զ. Նաղաշյանի, անասնաբուժական եւ անասնաբուժական գիտական կենտրոն ՊՓԲԸ տնօրեն, ԳԳՏԱ-ի թղթակից անդամ, պրոֆեսոր Կ. Ե. Աբելյանի, ԳԱԱ-ի կենդանաբանության ինստիտուտի փոխտնօրեն, բաժնի վարիչ, ավագ գիտաշխատող Գ. Գ. Բոյախյանի կողմից տրված գրավոր դրական կարծիքները եւ կազմակերպեց քննարկում աշխատանքի վերաբերյալ:

Ելույթ ունեցան

խորհրդի անդամներ, պրոֆեսորներ Գ. Զ. Նաղաշյանը, Ս. Լ. Գրիգորյանը, Ա. Վ. Վարդանյանը, Ռ. Ս. Մխիթարյանը՝ նշելով տեղեկատուի դերի եւ նշանակության մասին:

Որոշեցին

Երաշխավորել եւ խնդրել ԶԳԱ-ի մեթոդխորհրդի խմբագրական կոլեգիային թույլատրելու վերոհիշյալ տեղեկատուի տպագրությունը:

Մեթոդխորհրդի նախագահ՝ ՄԱՆԱՍՅԱՆ Ա. Վ.
Մեթոդխորհրդի քարտուղար ՄԽԻՅԱՐՅԱՆ Ռ. Ս.

ԿԱՐԾԻՔ

Վ. Մ. Սաֆրազբեկյանի, Ա. Վ. Մանասյանի «Գյուղատնտեսական կենդանիների մարսողական համակարգի ոչ վարակիչ հիվանդությունների բուժման դեղատոմսերի տեղեկատու» ուսումնական ձեռնարկի վերաբերյալ

Գյուղատնտեսական եւ ընտանի կենդանիների մարսողական համակարգի ոչ վարակիչ հիվանդությունները մեծ տարածում ունեն մեր հանրապետությունում եւ խոչընդոտում են ճյուղի զարգացմանը:

Հեղինակների կողմից առաջարկվող ուսումնական ձեռնարկը կօգնի անասնաբուժական բժշկագիտության ֆակուլտետի ուսանողությանը ճիշտ կողմնորոշվելու՝ մարսողական համակարգի հիվանդությունների բուժումը նշանակելիս:

Ձեռնարկում ընդգրկված են գործնականում հանդիպող մարսողական համակարգի համարյա բոլոր ոչ վարակիչ հիվանդությունները, յուրաքանչյուր բուժումից առաջ սեղմ բնութագրված է հիվանդությունը եւ բերված են տվյալ ախտահանության բուժման ամենաարդյունավետ դեղամիջոցների եւ դեղախառնուրդների դեղատոմսերը:

Դրական գնահատելով ուսումնական ձեռնարկը՝ ցանկանում են կատարել մի քանի առաջարկներ.

1. Հիվանդությունը բնութագրելիս ցանկալի է հարստացնել տեղեկությունները տվյալ ախտահանության առավել բնորոշ կլինիկական նշանների մասին:

2. Բացի կենդանիների անհատական բուժումից լավ կլիներ բերել օրինակներ նաեւ կենդանիների խմբային բուժման վերաբերյալ:

Գտնում են, որ Վ. Մ. Սաֆրազբեկյանի եւ Ա. Վ. Մանասյանի «Գյուղատնտեսական կենդանիների մարսողական համակարգի ոչ վարակիչ հիվանդությունների բուժման դեղատոմսերի տեղեկատու» ուսումնական ձեռնարկը անհրաժեշտ է երաշխավորել տպագրության:

**ԶԳԱ համաճարակաբանության
եւ մակաբուժաբանության ամբիոնի,
մակաբուժաբանության սեկտորի վարիչ,
ա.գ.դ., պրոֆեսոր Գ. Զ. Նաղաշյան**

ԿԱՐԾԻՔ

Վ. Մ. Սաֆրազբեկյանի, Ա. Վ. Մանասյանի «Գյուղատնտեսական կենդանիների մարսողական համակարգի ոչ վարակիչ հիվանդությունների բուժման համար» տեղեկագրի վերաբերյալ

Տեղեկագիրը նախատեսված է ՀԳԱ-ի անասնաբուժական բժշկագիտության ֆակուլտետի ուսանողների համար: Այն կազմված է ժամանակակից անասնաբուժական նվաճումների մակարդակով՝ հաշվի են առնված նաեւ բիոլոգիական այլ գիտությունների նվաճումները, հիվանդությունների ախտածնության եւ ախտորոշման բնագավառում:

Տեղեկագրում առանձին հիվանդությունների բուժման վերաբերյալ բերված են հակիրճ եւ նույնիսկ սպառիչ տվյալներ, որոնք, անշուշտ, ուսանողի համար շատ կարեւոր են:

Հեղինակներին հաջողվել է թղթին հանձնել այն ամենը, ինչ հայտնի է գիտությանը մարսողական համակարգի բուժման եւ կանխարգելման համար:

Ուսումնական ձեռնարկի տպագրությունը, անշուշտ, կդառնա ուսանողների, ինչպես նաեւ դասախոսների սեղանի գիրքը, իսկ պրակտիկ անասնաբույժի համար ամենամեծ նվերը:

Հաշվի առնելով վերոհիշյալը, նպատակահարմար է այն տպագրել եւ համալրել մինչեւ այժմ գոյություն ունեցող դասագրքերի, ուսումնական ձեռնարկների շարքը:

Տեղեկագիրը մայրենի լեզվով հեղինակների առաջին փորձն է, որը եւ գովելի է, սակայն ինչպես բոլոր առաջին փորձերը, զերծ չէ թերություններից, որը սակայն էական ազդեցություն չի ունենա ձեռնարկների բովանդակության էության եւ կարեւորության վրա:

Հայաստանի գյուղ. գիտությունների ակադեմիայի
թղթակից անդամ,
պրոֆեսոր Կ. ԱԲԵԼՅԱՆ

ԿԱՐԾԻՔ

Վ. Մ. Սաֆրազբեկյանի, Ա. Վ. Մանասյանի «Գյուղատնտեսական կենդանիների մարսողական համակարգի ոչ վարակիչ հիվանդությունների բուժման համար» տեղեկագրի վերաբերյալ

ՀՀ կառավարության որոշումներում որոշակի տեղ են զբաղեցնում գյուղատնտեսության հետագա զարգացմանը նվիրված հեռանկարային պլանները, որոնցում մասնավորապես ուշադրություն է դարձվում կենդանիների հիվանդությունների ախտորոշման, բուժկանխարգելիչ միջոցառումների անցկացման եւ գլխաքանակի պահպանման, վերարտադրման հարցերին: Այդ իսկ պատճառով մայրենի լեզվով ուսումնական ձեռնարկներ ունենալը կնպաստի վերոհիշյալ խնդիրների լուծմանը: Այս խնդրի արդիականությունը բխում է նրանից, որ կենդանիների հիվանդությունների հասցրած տնտեսական վնասները հասնում են հսկայական չափերի, իսկ այսօրվա բուժի ուսանողը, վաղվա անասնաբույժը՝ զրկված է մայրենի լեզվով դասագրքեր եւ ձեռնարկներ ունենալու հնարավորությունից: Հետեւաբար, ՀԳ ակադեմիայի անասնաբուժական բժշկագիտության ֆակուլտետի թերապիայի ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի կողմից կազմված տեղեկատուն՝ «Գյուղատնտեսական կենդանիների մարսողական համակարգի ոչ վարակիչ հիվանդությունների բուժման դեղատոմսերը», որը ընդգրկում է ծրագրային նյութը, նպատակահարմար է տպագրման եւ հրատարակման, քանզի պահանջը դրա նկատմամբ շատ մեծ է: Տեղեկատուն գրված է գրագետ, մատչելի եւ անպաճույճ:

ԳԱԱ կենդանաբանության ինստիտուտի փոխտնօրեն,
բաժնի վարիչ, ավագ գիտաշխատող
Գ. Հ. ԲՈՅԱԽՉՅԱՆ

**ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ
STOMATITIS
ՇՏՈՄԱՏԻՏ**

Առաջին հերթին անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել առանձնորդ մաշվածության վրա. կերակրաբաժնից հանել լորձաթաղանթը գրգռող և վնասվածք առաջացնող կոպիտ կերը: Եթե լորձաթաղանթի վրա կան մեռած հյուսվածքներ, ապա պետք է դրանք հեռացնել հերձակով (պինցետ) կամ այլ գործիքներով: Կենդանիներին տալ փափուկ կեր խոտ, սենած, վարսակի շփոթ: Յուրաքանչյուր կերակրումից հետո բերանի խոռոչը ցողել հետեյալ դեղամիջոցներով՝

1. Rp.: Sol. Acidi borici 3% - 300.0
D.S. Կովի բերանի խոռոչը ցողելու համար:
2. Rp.: Sol. Protargoli 2% - 100.0
D.S. խոզի բերանի խոռոչը ցողելու համար:
3. Rp.: Sol. Cupri sulfatis 1% - 300.0
D.S. Չիու բերանի խոռոչը ցողել օրը 3 անգամ:
4. Rp.: Liq. Burovi 50.0
Ag. destillatae 150.0
MD, S. Գորթին: Ցողել բերանի լորձաթաղանթը :
5. Rp.: Sol. Hydrogenii peroxydi 1% - 500.0
D.S. Ոչխարի բերանի խոռոչը ցողել օրը 3-4 անգամ:
6. Rp.: Kalii hypermanganatis 0.5
Aquaе destillatae 500.0
M.f. solutio
D.S. Չիու բերանի խոռոչը ցողելու համար:
7. Rp.: Zinci sulfatis 0.5
Aquaе destillatae 200.0
M.D.S. Կովին, բերանի խոռոչի ողողման համար, օրը 3-4 անգամ:
8. Rp.: Sol. Creolini 0.5% - 200.0
D.S. Շան բերանի խոռոչը ցողելու համար:
9. Rp.: Solutionis Acidi tannici 0.5% - 300.0
D.S. Չիու բերանի լորձաթաղանթը ցողելու համար:
10. Rp.: Aluminis 6.0

11. Rp.: Aquaе destillatae 300.0
M.D.S. խոզի բերանի խոռոչը ցողելու համար:
Tincturae Iodi 5.0
Glycerini 35.0
M.D.S. Փափուկ խոզանակով քսել խոզի բերանի լորձաթաղանթին:
12. Rp.: Sol. Natrii hydrocarbonatis 3% - 400.0
D.S. Ցողել խոզի բերանի խոռոչը:
13. Rp.: Infusi flor. Chamomillae 10.0 - 100.0
Infusi foliorum Salviae 15.0 - 150.0
M.D.S. Բերանի խոռոչի ողողման համար:
14. Rp.: Solutionis Argenti nitratis 0.5% - 300.0
Da in vitro nigro.
S. Բերանի խոռոչի ողողման համար:
15. Rp.: Boracis 4.0
Aquaе destillatae 200.0
M.D.S. Ողողել բերանի խոռոչը:
16. Rp.: Sol. Natrii chloridi 2% - 300.0
D.S. Ողողել բերանի խոռոչը:
17. Rp.: Sol. Gramicidini 0.05% - 300.0
D.S. Ցողել խոճկորի բերանի խոռոչը, օրական 3 անգամ:
18. Rp.: Sol. Antiformini 5% - 30.0
D.S. Քսել շան լնդերին, օրը 3 անգամ, 4 օր անընդմեջ:
19. Rp.: Sol. No-spa 2% - 2.0
D.T.d N6 in ampullis
S. Ներմկանային, օրը 3 անգամ, 1-ական ամպուլ:
20. Rp.: Sol. Iodi spirituosae 5% - 20.0
Glycerini 50.0
Olei Vaselini 10.0
M.D.S. Քսել ձիու լնդերի և շրթունքների խոցերին (փափուկ խոզանակով), օրը 3 անգամ, 5 օր անընդմեջ:
21. Rp.: Sol. Furacilini 0.02% - 200 ml
D.S. Չիու բերանի լորձաթաղանթը ցողելու համար:
22. Rp.: Solutionis Albargini 2% - 300.0
D.S. Քսել բերանի խոռոչի խոցերին:

23. Rp.: Infusi foliori Salviae 400.0
D.S. Ողողել բերանի խոռոչը, օրական 3-4 անգամ:
24. Rp.: Solutionis Lysoli 0.5% - 400.0
D.S. Ողողել ձիու բերանի խոռոչը օրական 3-4 անգամ:
25. Rp.: Chinosoli 1.0
Aq. destillatae ad 100 mi
M.D.S. Արտաքին, ցողել լորձաթաղանթը:
26. Rp.: Acidi borici 5.0
Aq. Menthae 20 mi
Aq. destillatae ad 200 mi
M.D.S. Արտաքին, ցողել բերանի լորձաթաղանթը:
27. Rp.: Althacridini lactatis 0.1% - 200 ml
D.S. Արտաքին, քսել լորձաթաղանթին:
28. Rp.: Acidi borici 1.0
Acidi salicylici 5.0
Zinci oxydi 25.0
Talci 50.0
M.f. pulvis
D.S. Արտաքին, փչել բերանի խոռոչի խոցային ստոմատիտի դեպքում:

ԸՍՊԱՆԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ (ՖԱՐԻՆԳԻՏ) PHARINGITIS ՓԱՐԻՈՂԻՏ

Չիվանդ կենդանիներին մեկուսացնել եւ տեղափոխել միջանցիկ քամիներից զուրկ, տաք անասնաշենքեր: Ապահովել տաք ջրով, փափուկ եւ դյուրամարս կերով:

Ընպանի հատվածին դնել տաք փաթաթաններ, կիրառել դիաթերմիա, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների արհեստական աղբյուրներ (Մինհինի լամպ, սոլյուքս), մերսել կամ ֆորայի յուղով, կատարել ինհալյացիա ախտահանիչ դեղանյութերով:

Չիվանդության բարդացումների դեպքում (բրոնխոպնեւոնիա) օգտագործել հետևյալ դեղամիջոցները

29. Rp.: Collargoli 2.0
Sacchari Lactici 25.0
M.f. pulvis
D.S. Ներփչել շան ընպանի լորձաթաղանթին:
30. Rp.: Morphini hydrochloridi 0.3
Pilocarpini hydrochloridi 0.05
Aquae destillatae 5.0
M.f. solutio. Sterilisetur
D.S. Չիուն ենթամաշկային, կրկնել 3 օրվա ընթացքում:
31. Rp.: Codeini phosphatis 0.4
Apomorphini hydrochloridi 0.015
Sirupi simplicis 15.0
Aquae destillatae 200.0
M.D.S. Շանը ներքին, օրական 2 անգամ, 1 ճաշի գրպա:
32. Rp.: Sol. No-spa 2% 2.0
D.t.d. N6 in ampullis
S. Շանը՝ ներկանային, օրական 2 անգամ 1-ական ամպուլ:
33. Rp.: Caps. Sumamedi 250.0
D.t.d. N6
S. Շանը՝ ներքին, առաջին օրը օրական 2-ական ամպուլ, իսկ 2 օրից հետո 5 օր անընդմեջ 1-ական ամպուլ՝ 1 ժամ կերակրելուց առաջ:
34. Rp.: Streptocidi
Natrii salicylatis ana 6.0
M.f. pulvis
D.t.d. N12
S. Չիուն ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական փոշի:
35. Rp.: Spiritus Sinapis 250.0
D.S. Կովին արտաքին, շփել ընպանի հատվածը:
36. Rp.: Streptocidi solubiliae 5.0
Sol. Glucosae 20% - 300.0
M.f. solutio sterilisatal
D.S. Չիուն ներերակային,

- միանվագ ներարկման համար:
37. Rp.: **Acidi tannici**
Acidi salicylici
Camphorae ana 5.0
Amyli tritici 40.0
M.f. pulvis
D.S. Ներփչել ընթացի խոռոչը, օրական 2 անգամ:
38. Rp.: **Sol. Zinci chloridi 5% - 500.0**
D.S. Կովի ընթացը ցողելու համար:
39. Rp.: **Sol. Natrii salicylatis 10% - 100.0**
Sterilisetur!
D.S. Ներերակային:
40. Rp.: **Argenti nitratis 2% - 500.0**
D.S. Կովի ընթացը ցողել օրական 2 անգամ:
41. Rp.: **Aethacridini lactatis 0.2% - 500.0**
D.S. Չիու ընթացը ցողել ռետինե խողովակի օգնությամբ, օրական 2 անգամ:
42. Rp.: **Sol. Lugoli cum glicerino 20.0**
D.S. Շան ընթացին եւ նշագեղծերին քսել փափուկ խոզանակով:
43. Rp.: **Sol. Iodi spirituosae 5% - 15.0**
Glycerini 60.0
M.D.S. Չիու՝ քսել ընթացի հատվածին:
44. Rp.: **Benzylpenicillini-natrii 500 000ԱԱ**
D.t.d. N30 in flac.
S. Չիու՝ ներերակային, ներարկել 0.5%-անոց նովոկայինի լուծույթով, 1000000 ԱԱ օրական 3 անգամ, 5 օր շարունակ:
45. Rp.: **Streptomycini sulfatis 1000000 ԱԱ**
D.t.d. N30 in flac.
S. Չիու՝ ներմկանային, ներարկել նովոկայինի 0.5%-ի լուծույթով, օրական 3 անգամ 1000000 ԱԱ:
46. Rp.: **Oxytetracyclini hydrochloridi 100000 ԱԱ**
D.t.d. N10 in flac.
S. Մտրուկին՝ ներմկանային, ներարկել նովոկայինի 2%-անոց լուծույթով,

- օրական 2 անգամ 100000 ԱԱ, 5 օրվա ընթացքում:
47. Rp.: **Susp. Sporidexi - 60.0**
D.S. Ներքին 5-10 մլ, օրական 3-4 անգամ:

ԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ OESOPHAGITIS ВОСПАЛЕНИЕ ПИЩЕВОДА

Կերակրափողի հիվանդությունները հազվադեպ են պատահում: Ավելի հաճախ հիվանդանում են խոզերը, տավարը եւ ձիերը: Բորբոքային պրոցեսը մեղմելու նպատակով պետք է խմեցնել սառը ջուր, դնել սառույցի կտորներով թրջոցներ:

48. Rp.: **Morphini hydrochloridi 0.4**
Aquae destillatae 5.0
M.f. sol. Sterilisetur!
D.S. Չիու՝ ենթամաշկային:
49. Rp.: **Aluminis 0.5% - 500.0**
D.S. Չիու՝ բերանի խոռոչը եւ կերակրափողը ցողելու համար, օրական 2 անգամ:
50. Rp.: **Tannini 1.0**
Mucilaginis seminis Lini 150.0
M.D.S. Չիու՝ ներքին:
51. Rp.: **Argenti nitratis 1.0**
Aquae destillatae 1000.0
M.f. solutio.
D.S. Չիու՝ ցողել կերակրափողի լորձաթաղանթը:
52. Rp.: **Sol. Ichthyoli 1% - 1000.0**
D.S. Տավարին՝ ներքին, օրական 0.5 բաժակ, 4 անգամ:
53. Rp.: **Sol. Omnoponi 1% - 1.0**
D.t.d. N4 in ampullis
S. Շանը ենթամաշկային, 1 մլ առավոտյան եւ երեկոյան:
54. Rp.: **Sol. Kalii hypermanganatis 0.05% - 200.0**
D.S. Խոճկորին՝ ներքին, օրական 1/4 բաժակ, 4 անգամ:

55. Rp.: Sol. Lysoli 0.5% - 1000.0
D.S. Չիուն ներքին, 0.5 բաժակ,
օրական 4 անգամ՝ ուտելուց 2 ժամ անց:
56. Rp.: Tincturae Opii simpl. - 25.0
D.S. Չիուն ներքին, մեկ շիշ ջրի հետ:
57. Rp.: Chlorali hydrati - 30.0
Mucilag. Gummi arabici - 200.0
M.D.S. Չիուն ներսուծել ուղիղ աղիքով:
58. Rp.: Aquae chloroformii - 300.0
D.S. Տավարին ներքին, միանվագ:
59. Rp.: Sol. Tannini 0.5% - 300.0
D.S. Շանը ներքին, օրական 4 անգամ
մեկ ճաշի գդալով լցնել բերանի խոռոչը:

ԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂԻ ՋՂԱՉԳՈՒԹՅՈՒՆ OESOPHAGOSPASMUS СПАЗМЫ ПИЩЕВОДА

Տավարի ցավերը մեղմելու նպատակով նշանակում են առորային, պլատիֆիլին, քլորալհիդրատ, մորֆին եւ քլորոֆորմի ջուր:

60. Rp.: Chlorali hydrati - 30.0
Mucilagini gummi arabici - 250.0
M.D.S. Տավարին ներսուծել ուղիղ աղիքով:
61. Rp.: Morphini hydrochloridi - 0.3
Aquae destillatae - 5.0
M.f. sol. Sterilisetur!
D.S. Չիուն ենթամաշկային:
62. Rp.: Kalii bromidi - 45.0
Pul. radices Althaeae et
Aquae fontana q.s. ut fiat boli N3
D.S. Չիուն ներքին, օրական 1-ական բոլուս
63. Rp.: Platyphyllini hydrotartratis - 0.025
Aquae destillatae - 5.0
M.f. solutio. Sterilisetur!

- D.S. Տավարին ենթամաշկային:
64. Rp.: Atropini sulfatis - 0.025
Aquae destillatae - 5.0
M.f. sol. Sterilisetur!
D.S. Չիուն ենթամաշկային:
65. Rp.: Sol. Calcii chloridi 10% - 10.0
D.t.d. N10 in ampullis
S. Երինջին ներերակային, օրական 1 անգամ 30 մլ:
66. Rp.: Natrii bromidi
Kalii bromidi ana - 5.0
M.f. pulvis
D.t.d. N30
S. Չիուն օրական 1 փոշի, 2 անգամ:

ԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂԻ ՊԱՐԱԼԻՉ PARALYSIS OESOPHAGI ПАРАЛИЧ ПИЩЕВОДА

Կուտակված կերը անհրաժեշտ է դուրս հանել մերսման միջոցով կամ գոնդով հրել դեպի ստամոքս: Հիվանդ կենդանիներին կերակրել փափուկ, դյուրամարս կերով: Պարբերաբար կիրառել էլեկտրաթերապիա, ֆարադիզացիա, էլեկտրավիբրացիա՝ նշանակելով ստրիխնին եւ վերատրին:

67. Rp.: Strychnini nitratis 0.1
Aq. destillatae 10.0
M.f. solutio. Sterilisetur!
D.S. Չիուն ենթամաշկային, օրական 2 մլ:
68. Rp.: Veratrini 0.03
Spiritus Vini rectificati 5.0
M.D.S. Տավարին ենթամաշկային:
69. Rp.: Olei Vaselini 80.0
D.S. Ներքին, 2 ճաշի գդալ, օրական 2 անգամ:

**ԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂԻ ԽՑԱՆՈՒՄ
OBTURATIO OESOPHAGI
ЗАКУПОРКА ПИЩЕВОДА**

Կերակրափողի խցանումը օտար մարմիններով հաճախ հանդիպում է ստավարի եւ հազվադեպ՝ մասկերների մոտ: Եթե խցանող նյութը գտնվում է պարանոցի միջին եւ վերջին հատվածում, ապա այդ դեպքում պետք է կերակրափողի մեջ լցնել բուսական ձեթ կամ վազելինի յուղ եւ կերակրափողի հատուկ զոնդի միջոցով օտար մարմինը աստիճանաբար ներմղել դեպի ճախաստամոքսը: Հակառակ դեպքում անհրաժեշտ է ձախ կողմից կտրել կերակրափողը եւ հեռացնել օտար մարմինը: Լավ արդյունքի են հասնում, երբ պարանոցի հատվածի կերի խտացման տեղում դնում են տաք կոմպրես կամ տաքացրած խաշիլ, որոնք հեշտացնում են կերագոնի շարժումները:

70. Rp.: Sol. Chlorali hydrati steril. 5% - 200.0
D.S. Չիուն՝ ներերակային, օտար մարմինը դեպի ստամոքս ներմղելուց առաջ:
71. Rp.: Sol. Novocaini 0.5% - 200.0
D.S. Տավարին՝ ներքին, տալ կերակրափողի զոնդի միջոցով՝ օտար մարմինը դեպի ստամոքս ներմղելուց առաջ:
72. Rp.: Sol. Papaverini hydrochloridi 2% - 2.0
D. in ampullis
S. Շանը՝ ենթամաշկային. օտար մարմինը հանելուց առաջ:
73. Rp.: Sol. Atropini sulfatis 0.1% - 1.0
D.t.d. N10 in ampullis
S. Տավարին՝ ենթամաշկային, միանվագ օտար մարմինը ստամոքս ներմղելուց առաջ:
74. Rp.: Sol. Platyphyllini hydrotartratis 0.2% - 1.0
D.t.d. N10 in ampullis
S. Տավարին՝ ենթամաշկային, միանվագ: Օտար մարմինը կերակրափողից հանելուց առաջ:
75. Rp.: Olei Vaselini - 200.0
D.S. Տավարին՝ ներմուծել կերակրափողի մեջ զոնդի միջոցով օտար մարմինը հանելուց առաջ:

76. Rp.: Sol. Aminazini 2.5% - 1.0
D.t.d. N6 in ampullis
S. Տավարին՝ ենթամաշկային: Ներառվել 100 մլ ախտահանված գլյուկոզայի 40% լուծույթի հետ, միանվագ, օտար մարմինը հեռացնելուց առաջ:
77. Rp.: Sol. Novocaini 3% - 200.0
Sterilisetur!
D.S. Տավարին՝ ենթամաշկային, կերակրափողի խցանված հատվածում:
78. Rp.: Plantaglucidi - 50.0
D.S. Շանը՝ ներքին, 1 թեյի գդալ, օրական 2-3 անգամ 1/4 բաժակ զուլ ջրով, կերակրելուց առաջ:

**ՆԱԽԱՍՏԱՍՈՔՍՆԵՐԻ ՀԻՊՈՏՈՆԻԱ
HYPOTONIA RUMINIS, RETICULI ET OMASI
ГИПОТОНИЯ ПРЕЖЕЛУДКОВ**

Անհրաժեշտ է վերականգնել նախաստամոքսների աշխատանքը: Կերից առաջացած հիպերտոնիան սովորաբար հեշտ է բուժվում: Չախն սովափոսից կատարել պտուտակածեւ մերսում, որը կրկնել օրական 2-4 անգամ: Նախաստամոքսները կարելի է զրգռել սառը հոգնայի միջոցով:

Ներքոհիշյալ դեղորայքի օգտագործումը խթանում է նախաստամոքսների ֆունկցիան:

79. Rp.: Resorcini 8.0
D.S. Տավարին՝ ներքին միանվագ:
80. Rp.: Physostigmini salicylatis 0.06
Pilocarpini hydrochloridi 0.2
Aq. destillatae sterilisatae 10.0
M.D.S. Տավարին՝ ենթամաշկային, 2 անգամ ներարկելու համար:
81. Rp.: Rhizomatis Veratri albi pulverati 5.0
Tartari stibiati 2.0
Infusi foliori Chamomillae ex 15.0 - 400.0

82. Rp.: M.D.S. Տավարին՝ ներքին միանվագ:
Tincturae Veratri albi 12.0
D.S. Տավարին՝ ներքին, մեկ բաժակ ջրով, միանվագ:
83. Rp.: Magnesii sulfatis 40.0
D.S. Ոչխարին՝ ներքին, մեկ բաժակ ջրով:
84. Rp.: Aloes pulverati 30.0
Magnesii sulfatis 250.0
M.D.S. Տավարին՝ ներքին, 2 լիտր ջրի հետ:
85. Rp.: Solutionis Carbacholini 0.1% 3.0
Sterilisata!
D.S. Տավարին՝ ենթամաշկային,
մեկ անգամ ներարկելու համար:
86. Rp.: Spiritus Vini 40° - 400.0
D.S. Տավարին՝ ներքին, 2 անգամ ընդունման համար,
օրվա ընթացքում:
87. Rp.: Salis Carolini factitii pulverati - 400.0
Herbae Absinthii pulverati - 130.0
M.D.S. Տավարին՝ ներքին, օրական 3 անգամ,
2 ճաշի գդալ:
88. Rp.: Acidi hydrochloridi diluti - 300.0
D.S. Տավարին՝ ներքին. 1 ճաշի գդալը լուծել
3 լ ջրում եւ տալ օրական 2 անգամ:
89. Rp.: Rhisomatis Veratri albi pulverati - 5.0
Aloes pulverati - 20.0
Mucilaginis seminis Lini 200.0
M.D.S. Տավարին՝ ներքին:
90. Rp.: Pilocarpini hydrochloridi 0.3
Aquae destillatae 5.0
M.f. solutio. Sterilisetur!
D.S. Տավարին՝ ենթամաշկային միանվագ
օգտագործման համար:
91. Rp.: Formalini 15.0
D.S. Տավարին՝ ներքին:
92. Rp.: Ichthyoli 15.0
Aq. fontanae 300.0
M.D.S. Տավարին՝ ներքին, մեկ անգամ

93. Rp.: ընդունման համար:
Natrii chloridi
Natrii sulfatis 200.0
M.D.S. Տավարին՝ ներքին, օրական 2 անգամ,
2-ական ճաշի գդալ:
94. Rp.: Coffeini-natrii benzoatis 2.0
Natrii chloridi - 30.0
Sol. Glucosi 20% - 300.0
M.f. solutio. Sterilisetur!
D.S. Տավարին՝ ներերակային,
մեկ անգամ ներարկելու համար:
95. Rp.: T-rae Strychni - 30.0
D.S. Տավարին՝ ներքին, մեկ թեյի գդալ,
մեկ բաժակ ջրով:
96. Rp.: Herbae Absinthii pulverati - 150.0
D.S. Տավարին՝ օրական 2 ճաշի գդալ:
97. Rp.: Strichnini nitratis - 0.05
Aq. destillatae - 10.0
M.f. solutio Sterilisata
D.S. Տավարին՝ ենթամաշկային:
98. Rp.: T-rae Veratri albi - 10.0
D.S. Տավարին, ներքին: Միանվագ, 1 շիշ ջրի հետ:
99. Rp.: Sol. Proserini 0.05% - 1.0
D.t.d. N10 in ampullis
S. Տավարին ենթամաշկային, միանվագ:

ԿՏՐԻՉԻ ՊԵՐԼՅՈՒՄ DILATATIO RUMINIS ПЕРЕПОЛНЕНИЕ РУБЦА

Նախաստամոքսների կծկումները աշխուժացնելու համար զրգռում են լեզվի արմատը կամ ընկանը: Լավ արդյունքի են հասնում կտրիչի ձախ կողմի հատվածում 5-10 րոպե տեւողությամբ պտուտակածեւ մերսում կատարելիս: Եթե ներքոհիշյալ դեղամիջոցները չեն կատեցնում հի-

վանդության զարգացումը, պետք է պահպանել սրտանոթային համակարգի գործունեությունը, ներարկել կոֆեին (3-5 գ), կատարել կտրիչի կտրվածք եւ դուրս բերել պարունակությունը:

100. Rp.: Tincturae Strychni 8.0
D.S. Տավարին ներքին, միանվագ, մեկ շիշ ջրի հետ:
101. Rp.: Creolini 6.0
D.S. Տավարին ներքին, միանվագ մեկ շիշ ջրով:
102. Rp.: Spiritus Vini rectificati 150.0
Aq. destillatae 250.0
M.D.S. Տավարին ներքին, մեկ շիշ ջրով:
103. Rp.: Pilocarpini hydrochloridi 0.04
Aquae destillatae 5.0
M.f. solutio. Sterilisetur!
D.S. Տավարին ենթամաշկային, միանվագ օգտագործման համար:
104. Rp.: Tincturae Veratri 15.0
D.S. Տավարին ներքին, 2 անգամ ընդունման համար:
105. Rp.: Pulveris rhizomatis Veratri albi
Tartari stibiatii 4.0
M.f. pulvis
D.S. Տավարին ներքին, մեկ շիշ ջրի հետ:
106. Rp.: Rhizomstis Veratri albi pulverati 20.0
Herbae Absinthii pulverati 100.0
Natrii sulfatis 200.0
M.f. pulvis
Dividat in partes aequales N3
D.S. Տավարին ներքին, օրական մեկ փոշի:
107. Rp.: Salis Carolini factitii 200.0
D.S. Տավարին ներքին, մեկ լիտր ջրի հետ, 2 անգամ ընդունման համար:
108. — Rp.: Coffeini-natrii benzoatis - 3.0
Natrii chloridi - 30.0
Sol. Glucosi 20% - 300.0
M.f. solutio steril.
D.S. Տավարին ներերակային, միանվագ:

109. Rp.: Rhizomatis Veratri pulv. - 5.0
Radices Gentianae pulv. - 10.0
Magnesii sulfatis - 75.0
M.f. pulvis
D.t.d. N2
S. Տավարին ներքին, օրական մեկ փոշի:

ԿՏՐԻՉԻ ՓՔԱՆՔ TYMPANIA RUMINIS ТИМПАНИЯ РУБЦА

Բուժումը պետք է նպատակ ունենա դրանց վերացնելու, փքանքի առաջացման պատճառները, գազերի գոյացումը կանխելու, ինչպես նաև դուրս բերելու ուղղությամբ: Գազերի հեռացումը կատարվում է զոնդահարման եւ կտրիչի մերսման միջոցով, որոնք պետք է ուղեկցվեն բխկոցների արագացմամբ:

Ցանկալի է փոխել կենդանու դիրքը այնպես, որ առջևի վերջավորությունները լինեն 15 սմ բարձր, որպեսզի թոքերն ազատվեն ճնշումից: Բացի դրանից, պետք է լեզուն ընդմիջումներով ձգել դուրս եւ բաց թողնել, միաժամանակ ձախ կողմից բռունցքով սեղմել կտրիչը:

Բխկոցներ առաջացնելու նպատակով ձախ սովափոսում 5-10 րոպե տեսողությամբ կատարել պտուտակածեւ մերսում:

110. Rp.: Creolini 20.0
D.S. Տավարին ներքին, 1 շիշ ջրի հետ:
111. Rp.: Magnesii sulfatis 300.0
Aloes pulverati 25.0
M.D.S. Տավարին ներքին, խառնել 1.5 լիտր ջրի հետ:
112. Rp.: Formalini 30.0
D.S. Տավարին ներքին, 2 լիտր ջրի հետ:
113. Rp.: Tympanoly 20.0
D.S. Տավարին ներքին, միանվագ 2 լիտր ջրի հետ:
114. Rp.: Sicadeini 50.0
D.S. Տավարին ներքին, խմեցնել 1.5 լիտր ջրի հետ:
115. Rp.: Mentholi 2.0

116. Rp.: Spiritus aethylici 100.0
Aq. fontanae ad 1000.0
M.D.S. Տավարին ներքին, միանվագ, զոնդի միջոցով:
Acidi hydrochloridi diluti 100.0
Sol. Natrii chloridi 1% 4000.0
M.f. solutio
D.S. Գորթին ներքին, օրական 2 անգամ 1-ական բաժակ, նախքան կերակրելը:
117. Rp.: Ichthyoli 15.0
D.S. Տավարին ներքին, մեկ շիշ ջրի հետ:
118. Rp.: Naphthalani 30.0
Saponis viridis 1.0
Aq. fontanae 500.0
M.f. emulsia.
D.S. Ոչխարին՝ միանվագ ներքին:
119. Rp.: Ichthyoli 15.0
Spiritus Vini 150.0
Acidi lactici 10.0
Aq. fontanae 1000.0
M.D.S. Տավարին ներքին, միանվագ:
T-rae Strychni 5.0
Ichthyoli 15.0
Aq. fontanae 1000.0
M.D.S. Տավարին ներքին, միանվագ:
121. Rp.: Resorcini 15.0
Naphthalani 5.0
Creolini 15.0
M.D.S. Տավարին ներքին:
122. Rp.: Ol. Terebinthinae 5.0
Spiritus aethylici 10.0
Aq. fontanae ad - 200.0
M.D.S. Ոչխարին ներքին, մեկ անգամ ընդունման համար, զոնդի միջոցով, գազերը հեռացնելուց հետո:
123. Rp.: Ol. Helianthi - 300.0
Sol. Ammonii caustici 1% - 100.0

124. Rp.: M.D.S. Տավարին ներքին,
1 անգամ ընդունման համար զոնդի միջոցով:
Sol. Ichthyoli 1% - 150.0
Spiritus aethylici - 20.0
M.D.S. Ոչխարին ներքին, 1 անգամ ընդունման համար՝ զոնդի միջոցով:
125. Rp.: Magnesii oxydi - 20.0
D.S. Տավարին ներքին, մեկ անգամ ընդունման համար՝ 1 լիտր զուլ ջրի հետ:
126. Rp.: Sol. Ichthyoli 0.5% - 200.0
D.S. Գորթին ներքին, մեկ անգամ ընդունման համար, զոնդի միջոցով:
127. Rp.: Carbonis ligni pulverati - 10.0
D.S. Գորթին ներքին:
128. Rp.: Sol. Jodi spirituosae 5% - 20.0
D.S. Կովին ներքին գազերը հեռացնելուց հետո:

ԿՏՐԻՉԻ ՊԱՐԱԿԵՐԱՏՈՉ PARAKERATOSIS RUMINIS ՄԱՐԱԿԵՐԱՏՈՅ ՐՅԵԼԿԱ

Գիմնականում հիվանդանում են հորթերը: Կերաբաժնի ռացիոնի մեջ պետք է ավելացնել հիմնականում կանաչ խոտ, սենած եւ ծղոտ: Բացի այդ, ցանկալի է ռացիոնի մեջ ավելացնել վիտամիններ A եւ D3, ռիբոֆլավին, տետրավիտ:

Կտրիչում կուտակված կաթնաթթուն մասնակի չեզոքացնելու նպատակով ներմուծել նատրիումի եւ կալցիումի հիդրոկարբոնատներ, ինչպես նաեւ մագնեզիումի օքսիդ:

129. Rp.: Natrii hydrocarbonatis
Calcii hydrocarbonatis
Magnesii oxydi aa 25.0
M.f. pulvis
D.t.d. N5
S. Գորթին ներքին, օրական 1 փոշի, 1 լիտր ջրի հետ,

- 5 օր անընդմեջ:
130. Rp.: *Faecis medicinalis* 5.0
Natrii hydrocarbonatis 10.0
M.f. pulvis
D.t.d. N20
S. Գորթին՝ ներքին, օրական 2 անգամ 1-ական փոշի:
131. Rp.: *Sol. Trivitaminii oleosae steril* 20.0
D.S. Գորթին՝ ներմկանային, 5 սլ. օրական:
132. Rp.: *Dradae Riboflavini* 0.01
D.t.d. N20
S. Գորթին՝ ներքին, օրական 2 անգամ, 2-ական դրածե:
133. Rp.: *Vicasoli* 0.01
D.t.d. N20 in *tabul.*
S. Շանը՝ ներքին, մեկական հաբ, օրական 2 անգամ, կաթի հետ:
134. Rp.: *Vicalini in tabul.* N100
D.S. Շանը՝ ներքին, 2 հաբ, օրական 3 անգամ, կաթի հետ:
135. Rp.: *Magnesii oxydi* 1.0
D.t.d. N20
S. Գորթին՝ ներքին, 1 փոշի օրական 2 անգամ, կաթի հետ, 10 օրվա ընթացքում:
136. Rp.: *Bismuthi subnitralis* 3.0
D.t.d. N10
S. Գորթին՝ ներքին, 1 փոշի, օրական 2 անգամ, 5 օր, կերակրելուց առաջ:
137. Rp.: *Sol. Vikasoli 1%* 1.0
D.t.d. N10 in *ampullis*
S. Խոճկորին՝ ներմկանային, 1 ամպուլ, օրական 2 անգամ, 5 օրվա ընթացքում:

ՏՐԱՎՄԱՏԻԿ ՌԵՏԻԿՈՒԼԻՏ ԵՎ ՌԵՏԻԿՈՒԼՈՊԵՐԻՏՈՆԻՏ

RETICULITIS ET RETICULOPERITONITIS TRAUMATICA

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РЕТИКУЛИТ И РЕТИКУЛОПЕРИТОНИТ

Բուժումը պետք է լինի կոմբերվատիվ եւ սիմպտոմատիկ: Առաջին հերթին կենդանուն տալ հանգիստ, ցավերը մեղմացնելու նպատակով նշանակել դեղամիջոցներ, որոնք թուլացնում են ռումինացիան: Բավարար չափով ապահովել փափուկ կերով, խոտով, շփոթով (թեփից եւ մանրացրած հատիկային կերից), լորձային եւ պատող հեղուկներով:

Կանխարգելման համար օգտագործել մագնիսական օղակ (Մելիքսեթթյան, 1964), մագնիսական որսիչ (Մելիքսեթթյան, Գարությունյան, 1974) եւ մագնիսական թակարդ (Գարությունյան, 1999, 2000):

138. Rp.: *Olei Helianthi*
Olei Ricini 100.0
D.S. Կովին՝ ներքին, միանվազ:
139. Rp.: *Infusi flor. Chamomillae* 50 - 1000.0
Ichthyoli 30.0
Spiritus Vini rectificati 100.0
M.D.S. Կովին՝ ներքին,
2 անգամ օգտագործման համար:
140. Rp.: *Olei Lini* 200.0
D.S. Կովին՝ ներքին, միանվազ:
141. Rp.: *Coffeini-natrii benzoatis* 2.0
Natrii chloridi 30.0
Solutionis Glucosi 20% 300.0
M.f. solutio steril.
D.S. Կովին՝ ներերակային, միանվազ:
142. Rp.: *Coffeini-natrii benzoatis* 2.0
Solutionis Glucosi 20% 300.0
M.f. solutio steril.
D.S. Կովին՝ ներերակային միանվազ ներարկման

- համար: Անհրաժեշտության դեպքում
3 օր հետո կրկնել:
143. Rp.: Solutionis Analgini 50% 2.0
D.t.d. N15 in ampullis
144. Rp.: S. Կովին՝ ներմկանային, օրական 10 մլ.
Spiritus aethylici 50.0
Aquae fontanae 300.0
M.D.S. Կովին՝ ներքին, միանվագ:
145. Rp.: Norsulfazoli 5% 500 ml
D.S. Տավարին՝ ներքին զոնդի միջոցով,
ցողել կերակրափողի լորձաթաղանթը:
146. Rp.: Phthalazoli 20.0
D.t.d. N12
S. Տավարին՝ ներքին, օրական 3 անգամ,
1-ական փոշի:
147. Rp.: Coffeini-natrii benzoatis 2.0
Hexamethylentetramini 6.0
Sol. Glucosi 20% 300.0
M.f. solutio steril.
148. Rp.: D.S. Կովին՝ ներերակային, միանվագ:
Sol. Natrii chloridi steril 10% 250.0
D.S. Կովին՝ ներերակային, միանվագ:
149. Rp.: Chinosoli 2.0
Paraffini 100.0
M.D.S. Կովին՝ ներքին, միանվագ, 2 լիտր կաթի հետ:
150. Rp.: T-rae Opii 60.0
D.S. Կովին՝ ներքին, օրական 2 անգամ:
151. Rp.: Magnesii sulfatis 200.0
D.S. Կովին՝ ներքին, լուծել 1 լիտր ջրի մեջ եւ խմեցնել
միանվագ: Կրկնել 3 օրվա ընթացքում:

ԳՐՔԻ ԽՑԱՆՈՒՄ OBTURATIO OMASI ЗАКУПОРКА КНИЖКИ

Փոխել կենդանու կերաբաժինը՝ տալով կանաչ, փափուկ եւ դյուրա-
մարս կեր: Պետք է ապահովել ջրով: Չորացած կերը գրքից դուրս բերելու
նպատակով նշանակել աղաթթվային պիլոկարպինի լուծույթ: Նախաստա-
մոքի կծկումները ուժեղացնելու համար տալ բարիումի քլորիդ:

Սրտի գործունեությունը խթանելու նպատակով նշանակել համապա-
տասխան դեղորայք:

Առանձին դեպքերում կարելի է գրքի մեջ ներմուծել լուծողական աղե-
րի լուծույթներ (մեծ տրամագծի ասեղներով՝ 0.2-0.3 սմ): Բացի դրանից
կարելի է ցնել նաեւ զանազան ձեթեր եւ լորձային նյութեր:

152. Rp.: Barii chloridi 3.0
D.S. Տավարին խմեցնել մեկ լիտր ջրի հետ:
153. Rp.: Olei Lini 300.0
D.S. Գորթին՝ ներքին:
154. Rp.: Natrii sulfatis 100.0
Aq. destillatae 500.0
M.f. solutio. Sterilisetur!
D.S. Կովին՝ միանվագ, ներարկել գրքի խոռոչի մեջ:
155. Rp.: Pilocarpini hydrochloridi 0.2
Aq. destillatae 5.0
M.f. solutio sterilisetur!
D.S. Կովին՝ ենթամաշկային:
156. Rp.: T-rae Veratri albi 10.0
D.S. Կովին՝ ներքին, միանվագ, 1 շիջ ջրի հետ:
157. Rp.: Sol. Carbacholini steril. 0.1% 3.0
D.S. Կովին՝ ենթամաշկային, միանվագ:
158. Rp.: Olei Olivari
Olei Lini aa 100.0
M.D.S. Կովին՝ ներքին, գրքի խոռոչի մեջ:

**ՍՏԱՍՈՔՍԻ ԼՈՐՉԱԹԱՂԱՆԹԻ ԿԱՏԱՐԱՅԻՆ
ԽՐՈՆԻԿ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ**

**GASTRITIS CATARRHALIS CHRONICA
ХРОНИЧЕСКИЙ КАТАР ЖЕЛУДКА**

Ստամոքսի խրոնիկ կատարը սովորաբար դժվար է բուժվում: Անհրաժեշտ է կենդանուն տալ դյուրամարս կեր եւ կերակրումը դարձնել ավելի հաճախակի: Մեծածավալ կերը օրվա ընթացքում տալ 5-7 անգամ, իսկ խտացած կերը՝ 3 անգամ: Գիմնական ուշադրությունը դարձնել դիետայի վրա, բարելավել զոոհիգիենիկ պայմանները: Նշանակել լուծողական, ինչպես նաեւ ադիբները գրգռող դեղամիջոցներ:

159. Rp.: Calomelanos 4.0
Aloes pulverati 15.0
Pul. rad. Althaeae et
Aq. destillatae q.s.
ut fiat boli N2
S. Չիուն՝ ներքին, ընդունել օրվա ընթացքում:
160. Rp.: Salis Carolini factitii 300.0
Herbae Absinthii 100.0
M.f. pulvis.
D.S. Չիուն՝ ներքին, 1-2 ճաշի գդալ, օրական
3 անգամ կերի հետ:
161. Rp.: Strychnini nitratis 0.05
Aq. destillatae 10.0
M.f. sol. Sterilisatae!
D.S. Չիուն՝ ենթամաշկային, 3 ներարկման համար:
162. Rp.: Tincturae amarae 25.0
Acidi hydrochloridi diluti 5.0
M.D.S. Շանը՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 10-15 կաթիլ:
163. Rp.: Tincturae Nucis vomicae 5.0
Tincturae amarae 15.0
M.D.S. Շանը՝ օրական 3 անգամ, 10 կաթիլ,
կերակրելուց առաջ:

**ՍՏԱՍՈՔՍԻ ԿԱՏԱՐԱՅԻՆ ՍՈՒՐ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ
GASTRITIS CATARRHALIS ACUTA
ОСТРЫЙ КАТАР ЖЕЛУДКА**

Նշանակել սոված դիետա՝ 24-30 ժամ, վերացնել առաջացնող պատճառները, այնուհետեւ կենդանուն տալ դյուրամարս փափուկ կեր:

Չետագայում պետք է սահմանափակել օրվա կերակրաբաժինը, նշանակել դիետա եւ ուշադիր հետեւել ստամոքսի թթվայնությանը:

Ստամոքսի պարունակության թթվային ռեակցիայի դեպքում պետք է տալ հիմքեր, իսկ հիմնային ռեակցիայի դեպքում՝ թթուներ (տես՝ ներքոհիշյալ դեղատոմսերը): Լավ արդյունք է տալիս նաեւ ստամոքսի լվացումը:

Բարձր թթվայնության դեպքում.

164. Rp.: Sol. Diprazini 2,5% 2.0
D.t.d. N10 in ampullis
S. Շանը՝ ներմկանային, օրական 2 անգամ, 1-ական մլ:
165. Rp.: Tabul. Furazolidoni 0.05
D.t.d. N30
S. Շանը՝ ներքին, օրական 4 անգամ, 1-ական հար, 1 շաբաթվա ընթացքում:
166. Rp.: Tabul. Bellalgini N20
D.S. Շանը՝ 0.5-1 հար, օրական 3 անգամ:
167. Rp.: Tabul. Festali N60
D.S. Շանը՝ օրական 3 անգամ, 1-ական հար:
168. Rp.: Extracti Belladonnae 0.2
Magnesiae ustae 8.0
Natrii hydrocarbonatis 10.0
Natrii sulfatis
Magnesii sulfatis aa 25.0
M.f. pulvis
D.S. Շանը՝ ներքին, 0.5 թեյի գդալով,
օրական 2 անգամ, կես բաժակ զոլ ջրով:
169. Rp.: Apomorphini hydrochloridi 0.05
Aq. destillatae sterilisatae 10.0
M.f. solutio. Da in vitro nigro
D.S. Շանը՝ ենթամաշկային, 1-2 մլ:

170. Rp.: *Calcii carbonatis praecipitati*
Natrii hydrocarbonatis aa 0.5
Ext. Belladonnae 0.015
 D.t.d. N20
 S. Շանը ներքին, օրական 3 անգամ,
 1-ական փոշի ջրի հետ:
171. Rp.: *Solutionis Natrii hydrocarbonatis 2%* 4000.0
 D.S. Չիուն՝ ստամոքսի լվացումների համար,
 քրոնպանային զոնդի միջոցով:
172. Rp.: *Magnesiae ustae* 15.0
 D.t.d. N10
 S. Չիուն ներքին, օրական 2 անգամ,
 1-ական փոշի կաթի հետ:
173. Rp.: *Pulveris rhizomatis Rhei* 80.0
Salis Carolini factitii 400.0
 M.f. pulvis
 D.S. Չիուն՝ ներքին, 1 ճաշի գդալ կերի հետ:
174. Rp.: *Natrii hydrocarbonatis* 150.0
Natrii chloridi 100.0
Pulveris fructus Anisi 70.0
 M.D.S. Չիուն՝ ներքին, 1 ճաշի գդալ, օրական
 4 անգամ կերի հետ:
175. Rp.: *Natrii sulfatis* 220.0
Natrii hydrocarbonatis 180.0
Natrii chloridi 90.0
Kalii sulfatis 10.0
 M.D.S. Չիուն՝ ներքին, 1 ճաշի գդալով,
 օրական 4 անգամ, կերից առաջ:
176. Rp.: *Sol. Furasolidoni 0.01%* 500.0
 D.S. *Per reclum* Շանը՝ ... օրական 3-4 անգամ:
177. Rp.: *Succus gastricus naturalis* 150.0
 D.S. Շանը՝ ներքին, օրական 2-3 անգամ, 1 ճաշի գդալ,
 կերակրելուց հետո:

Ցածր թթվայնության դեպքում՝

178. Rp.: *Acidi hydrochloridi diluti* 200.0
 D.S. Չիուն ներքին, 1 ճաշի գդալ, օրական 3 անգամ
 կես դույլ ջրի հետ:
179. Rp.: *Acidi hydrochloridi diluti*
Pepsini rossici aa 4.0
Tincturae Gentianae 10.0
Aq. destillatae 200.0
 M.D.S. Շանը՝ ներքին, 1 ճաշի գդալ, օրական 3 անգամ:
180. Rp.: *Barii chloridi* 3.0
Aq. destillatae 1000.0
 M.D.S. Չիուն ներքին, միանվագ:
181. Rp.: *Emulsionis olei Ricini* 100.0
 D.S. Շանը՝ ներքին, ճաշի գդալով, օրական 4 անգամ:
182. Rp.: *Veratrinum* 0.03
Spiritus Vini 70° 5.0
 M.D.S. Խոզին ենթամաշկային:
183. Rp.: *Creolini* 10.0
 D.S. Չիուն խառնել 1 լիտր ջրի հետ եւ
 ստամոքսը լվանալ զոնդի միջոցով:
184. Rp.: *Tab. Vicalini* 1.0
 D.t.d. N10
 S. Ստրուկին ներքին, օրական 3 անգամ,
 4-ական հաք ջրի հետ, կերակրելուց հետո:
185. Rp.: *Pepsini* 1.0
Acidi hydrochloridi diluti 1ml
Aq. destillatae ad 100 ml
 M.D.S. Գորթին ներքին 10 մլ,
 անմիջապես կերակրելուց հետո:
186. Rp.: *Extr. Aloes fluidi* 1 ml
 D.t.d. N20 in ampullis
 S. Ստրուկին՝ ենթամաշկային, օրական 2 անգամ:

ՄՍԱՄՈՔՍԻ ՍՈՒՐ ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ
DILATATIO VENTRICULI ACUTA
ОСТРОЕ РАСШИРЕНИЕ ЖЕЛУДКА

Գլխավոր ուշադրությունն ուղղել ստամոքսից գազերի, ինչպես նաև կերային մասսայի արագ հեռացմանը և կանխել հիվանդության հետագա զարգացումն ու կրկնությունը: Գազերը հեռացնելու նպատակով օգտագործել քթնապանային զոնդ, որը վազելիճով մշակելուց հետո զգուշությամբ քթից անցկացնել ստամոքսի մեջ և թողնել մինչև 1 ժամ: Ձոնդի օգնությամբ տեղաշարժել ստամոքսի պարունակությունը և կատարել ստամոքսի լվացում գոլ ջրով 0.1%-անոց աղաթթվի լուծույթով և նատրիումի հիդրոկարբոնատի 2%-անոց լուծույթով: Կենդանիներին պետք է 2-3 օր պահել դիետայի վրա:

Լավագույն բուժման միջոց է հանդիսանում կաթնաթթուն:

187. Rp.: Sol. Analgini 50% 10.0
Sterilisetur!
D.S. Չիուն՝ ներերակային, միանվագ:
188. Rp.: Acidi Lactici 10.0
Aq. fontanae 400.0
M.D.S. Չիուն՝ ներքին, քթնապանային զոնդով:
189. Rp.: Acidi Lactici 10.0
Ichthyoli 15.0
M.D.S. Չիուն՝ ներքին, մեկ շիշ ջրի հետ:
190. Rp.: Benzonaphtholi 8.0
Ex. Belladonnae 4.0
Pulveris radices Althaeae
et Aq. fontanae q.s. ut fiat bolus
D.S. Չիուն՝ ներքին:
191. Rp.: Chlorali hydrati 10% 130.0
Sterilisetur!
D.S. Չիուն՝ ներերակային, միանվագ:
Ցավերը կրկնվելու դեպքում՝ 2 ժամից կրկնել:
192. Rp.: Mentholi 1.5
Spiritus aethylici 100.0
Aq. fontanae 300.0

- M.f. solutio
D.S. Չիուն՝ ներքին:
193. Rp.: Acidi acetici 5.0
Aq. communis 500.0
M.D.S. Չիուն՝ ներքին:
194. Rp.: Aquae chloroformii 350.0
D.S. Չիուն՝ ներքին, միանվագ, քթնապանային զոնդով:
195. Rp.: Spiritus Vini rectificati 120.0
Aq. destillatae 300.0
M.D.S. Չիուն՝ ներքին, միանվագ,
քթնապանային զոնդով:
196. Rp.: Sol. Novocaini 1% 100.0
D.S. Չիուն՝ ներքին, միանվագ:
197. Rp.: Sol. Ichthyoli 1% 5000.0
D.S. Չիուն՝ ստամոքսը լվանալու համար,
քթնապանային զոնդի միջոցով:
198. Rp.: Naphthalani liguidi 30.0
Saponis viridis 5.0
M.D.S. Չիուն՝ լուծել 1 լ գոլ ջրի մեջ և տալ բերանով
զոնդի միջոցով:
199. Rp.: Solutionis Glucosi 20% 150.0
Sol. Coffeini-natrii benzoatis 10% 150.0
M.f. solutio steril
D.S. Չիուն՝ ներերակային, միանվագ:
200. Rp.: Sol. Natrii chloridi 10% - 100.0
M.f. sol. steril.
D.S. Չիուն՝ ներերակային, միանվագ:
201. Rp.: Sol. Natrii hydrocarbonatis 1% - 5000.0
D.S. Չիուն՝ ստամոքսը լվանալու համար:

ՄՏԱՄՈՔՍԻ ԽՈՑ
ULCUS VENTRICULI
ЯЗВА ЖЕЛУДКА

Հիվանդանում են շները, խոզերը եւ հորթերը:

Այս դեպքում պետք է նշանակել դիետա, կերակրել փափուկ կերով:

Քանի որ մեծ մասամբ ստամոքսի խոցը գոյանում է այն կենդանիների մեջ, որոնց ստամոքսի թթվայնությունը՝ խիստ բարձր է, ուստի պետք է անհապաղ իջեցնել թթվայնությունը՝ նշանակելով տոտադո, պատող նյութեր:

Շներին կարելի է տալ կաթ, թթվասեր, կարագ, հում ձու եւ այլն:

Խիստ ցավերի եւ լուծի ժամանակ նպատակահարմար է նշանակել ափիոնի ոգեթուրմ:

202. Rp.: Tannalbini
 Bismuthi subnitratris aa 0.3
 M.f. pulvis
 D.t.d. N2
 S. Խոճկորին՝ ներքին, 1-ական փոշի, օրական 3 անգամ:
203. Rp.: Methyluracini 0.5
 D.t.d. N50 in tab.
 S. Շանը՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական հաբ:
204. Rp.: Ferri sulfatis
 pulvis Aluminis aa 50.0
 Semenisi Lini pulverati 200.0
 M.f. pulvis
 D.S. Տավարին՝ ներքին օրվա ընթացքում 3 անգամ ընդունման համար, կրկնել 7 օր անընդմեջ:
205. Rp.: Atropini sulfatis 0.02
 Aq. destillatae - 15.0
 M.D.S. Շանը՝ ներքին, օրական 2 անգամ 10 կաթիլ:
206. Rp.: Ferri sulfatis et
 Corticis Guercus pulverati aa - 75.0
 Natrii hydrocarbonatis - 100.0
 Pulvis Radicis Gentiannae - 50.0

- M.f. pulvis
 D.S. Չիուն՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1 ճաշի գդալ ջրի հետ:
207. Rp.: Bismuthi subnitratris - 0.6
 Extr. Belladonnae - 0.02
 M.f. pulvis
 D.t.d. N12
 S. Շանը՝ ներքին, օրական 2 անգամ, 1-ական փոշի:
208. Rp.: Argenti nitratris - 3.0
 Aq. destillatae - 150.0
 M.f. solutio
 Da in vitro nigro.
 S. Շանը՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1 ճաշի գդալ կաթի, կարագի, թթվասերի կամ հում ձվի հետ:
209. Rp.: Olei Lini - 160.0
 D.S. Շանը՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 2 ճաշի գդալ, տաքացրած վիճակում:
210. Rp.: Magnesiae ustae - 0.5
 Natrii hydrocarbonatis - 1.0
 M.f. pulvis.
 D.t.d. N15
 S. Շանը՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական փոշի:
211. Rp.: Magnesii oxydi - 1.0
 D.t.d. N20
 S. Խոճկորին՝ ներքին, օրական 2 անգամ, 1 փոշի հեղուկ կերի հետ:
212. Rp.: Vikasoli - 0.03
 D.t.d. N24 in tabul
 S. Խոճկորին՝ ներքին, օրական 2 անգամ, 1-ական հաբ ջրի հետ:
213. Rp.: Vicasoli 1% - 1.0
 D.t.d. N10 in ampullis
 S. Խոճկորին՝ ներմկանային, օրական 2 անգամ 1 ամպուլ:
214. Rp.: Bismuthi subnitratris - 3.0
 D.t.d. N10

215. Rp.: S. Գորթին ներքին, 1 փոշի, օրական 2 անգամ,
կերակրելուց առաջ:
Magnesii oxydi - 3.0
D.t.d. N20
S. Գորթին ներքին, 1 փոշի, օրական 2 անգամ:

ՇՆԵՐԻ ՍՏԱՄՈՔՍԻ ԽՈՑԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ DOGS ULCUS VENTRICULI ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА У СОБАК

Առաջին հերթին պետք է վերացնել հիվանդությունն առաջացնող պատճառները: Հետո կերակրել հեղուկ կամ կիսահեղուկ կերերով՝ կաթնապուր խյուսեր՝ ավելացնելով կարագ կամ բուսական յուղեր, ձվի սպիտակուց, կաթ: Անհրաժեշտ է նաև իջեցնել թթվայնությունը: Կանգնեցնել արյունահոսությունը, նշանակել կալցիում պարունակող պատրաստուկներ:

216. Rp.: Magnesii oxydi
Aluminii. hydrooxydi aa 0.5
M.f. pulvis
D.t.d. N20
S. Շանը՝ ներքին: Օրը 2 անգամ, 1-ական փոշի,
կաթի հետ, 10 օր:
217. Rp.: Almageli A 170.0
D.t.d. N2 in flac.
S. Շանը՝ ներքին, 1-2 թեյի գդալ, օրական 4 անգամ,
30 րոպե կերակրելուց եւ քնելուց առաջ:
218. Rp.: Tabul Venterii N100
D.S. Շանը՝ ներքին, օրական 2 հաբ, 2 օր,
բուժման ժամկետը 2 ամիս:
219. Rp.: Magnesii oxydi
Calcii carbonatis 1.0
M.f. pulvis
D.t.d. N30
S. Շանը՝ ներքին, օրական 2 անգամ, 1-ական փոշի,
կաթի հետ, 2 շաբաթ անընդհատ:

220. Rp.: Bolii albi 1.0
D.t.d. N40 pulv.
S. Շանը՝ 1-ական փոշի, օրական 4 անգամ:
221. Rp.: Fructus Myrtilli 100.0
D.S. Շանը՝ 2 թեյի գդալ չոր պտուղը լցնել
1 բաժակ ջրի մեջ եւ պատրաստել ջրաթուրմ,
2 անգամ ընդունման համար:
222. Rp.: Vicalini in tabul. N100
D.S. Շանը՝ ներքին, օրական 3 անգամ,
2-ական հաբ կաթի հետ, 2 շաբաթվա ընթացքում:
223. Rp.: Bismuthi subnitratris 0.5
Extr. Belladonnae 0.015
M.f. pulvis
D.t.d. N12
S. Շանը՝ ներքին, օրական 2 անգամ, 1-ական փոշի:
224. Rp.: Argenti nitratris 0.1
Aq. destillatae 150.0
M.D. in vitro nigro.
S. Շանը՝ ներքին, թեյի գդալով, օրական 3 անգամ:
225. Rp.: Sol. Gelatinae 10% 100.0
D.S. Շանը՝ ներքին, թեյի գդալով,
1-2 ժամը մեկ անգամ:
226. Rp.: Plumbi acetatis 0.05
Sacchari albi 0.5
M.f. pulvis
D.t.d. N6
S. Շանը՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական փոշի:
227. Rp.: Sol. Calcii chloridi 10% 25.0
Sterilisatae—
D.S. Շանը՝ ներերակային, օրական 5 մլ:
228. Rp.: Succus gastricus naturalis 150.0
D.S. Շանը՝ ներքին, օրական 2-3 անգամ, 0.5 ճաշի գդալ,
կերակրելուց հետո:

ՄՏԱՄՈՔՄԻ ԵՎ ԲԱՐԱԿ ԱՂԻՔՆԵՐԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ
GASTROENTERITIS
ВОСПАЛЕНИЕ ЖЕЛУДКА И ТОНКОГО КИШЕЧНИКА

Հիվանդ կենդանիներին պետք է տալ փափուկ եւ դյուրամարս կեր: Գարու, ցորենի, հաճարի այլուրից պատրաստել շփոք կամ տալ կանաչ կեր: Բուժման սկզբնական շրջանում անհրաժեշտ է տալ լուծողականներ: Եթե արտաթորանքը բթվային է, ապա տալ 500-1000 գ լուծողական աղ, իսկ հիմնային ռեակցիայի դեպքում՝ 500-1000 գ ձեթ: Պետք է խուսափել այն դեղորայքից, որոնք ունեն հոտ եւ կարող են սսի որակը փչացնել, ինչպես, օրինակ, կարբոլաթթուն, կրեոլինը, իխտիոլը եւ այլ դեղանյութեր:

229. Rp.: T-rae Opii simplicis 35.0
Mucilaginis Gummi arabici 150.0
M.D.S. Չիուն ներքին:
230. Rp.: Tannalbini
Benzonaphtoli aa 0.5
M.f. pulvis
D.t.d. N6
S. Շանը ներքին, օրական 2 անգամ, 1-ական փոշի:
231. Rp.: Olei Ricini 500.0
D.S. Չիուն ներքին, միանվագ,
բթնականային զոնդի միջոցով, միանվագ:
232. Rp.: Decocti corticis Quercus ex 60.0-800.0
Ichthyoli 40.0
M.D.S. Կովին ներքին, 2 ընդունման համար:
233. Rp.: Sol. Natrii chloridi 0.85% 1000.0
Sterilisatae!
Sol. Adrenalini hydrochloridi 0.1% 3.0
M.D. in vitro nigro
S. Չիուն ներերակային:
234. Rp.: Fenilii salicylatis 60.0
Bismuthi subnitratris 40.0
Radiciis Liquiritiae pulverati et
Aq. destillatae quantum satis ut fiat boli N4
D.S. Չիուն ներքին, օրական 2 անգամ, 1-ական բոլուս:

235. Rp.: Naphthalani 100.0
Saponis viridis 10.0
Aquae fontanae 1000.0
M.D.S. Չիուն ներքին, բթնականային զոնդով:
236. Rp.: Sol. Ichthyoli 1% 200.0
D.S. Խոնկորին ներքին, 0.5 բաժակ,
օրական 2 անգամ:
237. Rp.: Furazolidoni 0.1
D.t.d. N20 in tabul.
S. Խոնկորին ներքին, օրական 4 անգամ,
1-ական հար, 5 օրվա ընթացքում:
238. Rp.: Olei Ricini 400.0
Aetheris aethylici 20.0
M.D.S. Չիուն ներքին, մեկ ընդունման համար:
239. Rp.: Solutionis Kalii hypermanganatis 0.25% 400.0
D.S. Չիուն ներքին, միանվագ, զոնդի միջոցով:
240. Rp.: Sol. Diprazini 2.5% 1.0
D.t.d. N10 in ampullis
S. Շանը ներականային, օրական 2 անգամ, 4-ական մլ:
241. Rp.: Phthalazoli 0.5
D.t.d. N20 in tabul
S. Խոզին ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական հար:
242. Rp.: Lysoli 20.0
D.S. Տավարին ներքին, 1 լիտր ջրի հետ:
243. Rp.: Synthomicini 0.5
D.t.d. N12 in tabul
S. Խոնկորին ներքին, օրական 3 անգամ,
1-ական հար:
244. Rp.: Sulgini 0.5
D.t.d. N20 in tabul
S. Մտրուկին ներքին, օրական 2 անգամ, 2 հար:
245. Rp.: Sulfadimetoxsini 0.5
D.t.d. N10 in tabul
S. Շանը ներքին, առաջին օրական 2 հար,
իսկ հաջորդ օրերը՝ 1-ական հար:
246. Rp.: Emulsi ol. Ricini ex 25.0-160.0

247. Rp.: D.S. Ծանր՝ ներքին, 2 անգամ ընդունման համար, գոլ վիճակում, 2 ժամ ընդմիջումով:
Caps. Imodiumi N20
D.S. Ծանր՝ ներքին, օրական 2 անգամ, 1-ական հար, սկզբնական չափաբաժինը՝ 2 հար:

ԲԱՐԱԿ ԵՎ ՀԱՍՏ ԱՂԻՔՆԵՐԻ ԼՈՐՉԱԹԱՂԱՆԹԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ

ENTEROCOLITIS

ВОСПАЛЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ТОНКОГО И ТОЛСТОГО ОТДЕЛА КИШЕЧНИКА

Նախքան բուժումն անհրաժեշտ է կենդանուն տալ հանգիստ եւ ջրալի կեր: Կերաբաժնից հեռացնել անորակ կերերը: Աղիքների լորձը լուծելու համար կերաբաժնի հետ կամ առանձին նշանակել խմորի սոդա: Կարելի է տալ ջուր եւ կերակրի աղ (2.0 աղ, 1 լիտր ջուր): Աղիքները ախտահանել, իսկ հարկ եղած դեպքում՝ տալ տտիպ դեղորայք՝ փորլուծը կանգնեցնելու համար: Միառժամանակ պետք է պահպանել սրտի եւ շնչառության գործունեությունը:

248. Rp.: Magnesii sulfatis 300.0
D.S. Չիուն՝ ներքին. լուծել 2 լիտր ջրի մեջ եւ խմեցնել ռետինե շշով:
249. Rp.: Olei Lini 500.0
D.S. Տավարին՝ ներքին, միանվագ, գոլ վիճակում:
250. Rp.: Emulsii olei Ricini ex 20.0-150.0
D.S. Ծանր՝ ներքին, 2 անգամ ընդունման համար գոլ վիճակում, 2 ժամ ընդմիջումով:
— 251. Rp.: Sol. Kalii hypermanganatis 0.05% 2000.0
D.S. Խոճկորին՝ գոլ վիճակում կատարել հոգնա 500 մլ 3 ժամ ընդմիջումով:
252. Rp.: Phenilii salicylatis 5.0
Natrii hydrocarbonatis 15.0
M.f. pulvis

D.t.d. N12
S. Չիուն՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական փոշի:
253. Rp.: Sol. Ichtyoli 1% 400.0
D.S. Էշին՝ ներքին: Լցնել բերանը, օրական 2 անգամ, 0.5 բաժակ:
254. Rp.: Synthomycini 0.5
D.t.d. N12
S. Խոճկորին՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական հար:
255. Rp.: Pulveris folii Digitalis 2.0
Fructus Juniperi pulv. 25.0
M.f. pulvis
D.t.d. N8
256. Rp.: S. Չիուն՝ ներքին, օրական 2 անգամ, 1-ական փոշի:
Sol. Kalii permanganatis 0.01 500.0
D.S. Ծանր՝ օրական 2 անգամ ստամոքսը լվանալ զոնդի միջոցով:
257. Rp.: Tabul. Laevomycetini 0.25
D.t.d. N24
S. Ծանր՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական հար, կերակրելուց առաջ:
258. Rp.: Tabul. Phthalazoli 0.5
D.t.d. N20
S. Ծանր՝ ներքին, օրական 4 անգամ, 1-ական հար, 5 օր անընդմեջ:
259. Rp.: Tabul. Sulgini 0.5
D.t.d. N21
S. Ծանր՝ օրական 3 անգամ, 1-ական հար, 1 շաբաթվա ընթացքում:
260. Rp.: Sol. Diprazini 2.5% 2.0
D.t.d. N10 in ampullis
S. Ծանր՝ ներմկանային, օրական 2 անգամ, 1-ական անպուլ :
261. Rp.: Sol. Camphorae oleosae 20% 10.0
D.t.d. N8 in ampullis
S. Չիուն՝ ենթամաշկային: Ներարկել առավոտյան

262. Rp.: **Theobromini 2.0**
D.t.d. N10
S. Չիուն՝ ներքին, օրական 2 անգամ, 1-ական փոշի:
263. Rp.: **Sol. Corazoli 10% 1.0**
D.t.d. N40 in ampullis
S. Տավարին ներերակային, 10 մլ, օրական 1 անգամ:
264. Rp.: **Phthalazoli 0.5**
D.t.d. N9 in tabul.
S. Գաղին ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական հար:
265. Rp.: **Decocti corticis Quercus ex 100.0-1000.0**
D.S. Չիուն՝ ներքին, 2 անգամ ընդունման համար, առավոտյան եւ երեկոյան, քթնմպանային զոնդով:

ԱՂԻՔՆԵՐԻ ՋՂԱՉԻԳ ԿՃԿՈՒՄՆԵՐ ENTERALGIA CATARRHALIS КАТАРАЛЬНЫЙ СПАЗМ КИШЕЧНИКА

Հաշվի առնելով, որ հիվանդության հիմքում ընկած է վեգետատիվ նյարդային համակարգի գերզոգում, որը արտահայտվում է հարթ մկանների սպազմով, ապա բուժումը պետք է նպատակաուղղված լինի սպազմը եւ ցավերը մեղմելուն:

Բուժումը կատարել արագ, թույլ չտալ բարդացումների հետագա զարգացմանը: Ցավերը մեղմացնելուց հետո, կենդանուն նշանակել լուծողական եւ ախտահանիչ դեղամիջոցներ:

Անհրաժեշտ է նաեւ հիվանդ կենդանուն նշանակել տաք հոգնա:

266. Rp.: **T-rae Opii simplicis 50.0**
Infus. flor. Chamomillae ex 15.0-250.0
M.D.S. Չիուն՝ ներքին, միանվագ,
քթնմպանային զոնդով:
267. Rp.: **Infusi flor. Chamomillae ex 25.0-500.0**
Spiritus aethylici 20.0
M.D.S. Չիուն՝ ներքին, միանվագ,
քթնմպանային զոնդով:

268. Rp.: **Mentholi 2.0**
Spiritus Vini 40% 400.0
M.D.S. Չիուն՝ ներքին, միանվագ, ռետինե շշով:
269. Rp.: **Infusi rhizom. Valerianae ex 30.0-500.0**
Aetheris aethylici 25.0
M.D.S. Չիուն՝ ներքին, քթնմպանային զոնդով:
270. Rp.: **Infusi folior. Menthae piperitae ex 25.0-500.0**
Formalini 5.0
M.D.S. Չիուն՝ ներքին, քթնմպանային զոնդով:
271. Rp.: **Pilocarpini hydrochloridi 0.08**
Aq. destillatae 10.0
M.f. solutio. Sterilisetur!
D.S. Չիուն՝ ենթամաշկային:
272. Rp.: **Opii pulverati 8.0**
Spiritus Vini rectificat 50.0
M.D.S. Չիուն՝ ներքին, միանվագ:
273. Rp.: **Natrii sulfatis 200.0**
Ichthyoli 10.0
Aq. fontanae 800.0
M.D.S. Չիուն՝ ներքին, կերակրափողային զոնդի միջոցով:
274. Rp.: **Plathyphyllini hydrotartratis 0.03**
Aq. destillatae 5.0
M.f. Solutio. Sterilisetur!
D.S. Չիուն՝ ենթամաշկային:
275. Rp.: **Sol. Atropini sulfatis 0.1% - 30.0**
Steril.
276. Rp.: **Calomelanos 4.0**
Aloes pulverati 15.0
Rad. Althaeae pulverati et
Aq. fontanae g.s. ut fiat boli N2
S. Չիուն՝ ներքին, օրվա ընթացքում:
277. Rp.: **Sol. Promedoli 1% 20.0**
Sterilisetur!
D.S. Չիուն՝ ենթամաշկային, միանվագ:

278. Rp.: Sol. Analgini 50% - 10.0
in ampullis
D.S. Չիուևն՝ ներերակային, միանվագ:
Լուծել 0.85% 100.0 նատրիումի
քլորի ախտահանված լուծույթի մեջ:
279. Rp.: Sol. Papaverini hydrochloridi 2% 20.0
Sterilisetur!
D.S. Չիուևն՝ ենթամաշկային, միանվագ:
280. Rp.: Sol. Ephedrini hydrochloridi 5%- 5.0
Sterilisetur!
D.S. Չիուևն՝ ենթամաշկային, միանվագ:
281. Rp.: Natrii sulfatis 220.0
Natrii hydrocarbonatis 180.0
Natrii chloridi 90.0
Kalii sulfatis 10.0
M.D.S. Չիուևն՝ ներքին, կերակրելուց առաջ,
1 ճաշի գդալ:
282. Rp.: Laevomycetini 0.5
D.t.d. N in talul.
S. Չիուևն՝ ներքին, օրական 3 անգամ 2 հաբ:

ԱՂԻՔՆԵՐԻ ԽՐՈՆԻԿ ԿԱՏԱՐ
ENTERITIS CATARRHALIS CHRONICA
ХРОНИЧЕСКИЙ КАТАР КИШЕЧНИКА

283. Rp.: Magnesii sulfatis 500.0
D.S. Կոպիւն՝ ներքին, 3 լիտր ջրի հետ:
284. Rp.: Fenilli salicylatis 10.0
Bismuthi subnitratris 5.0
Pulv. radices Ligunitiae et
Aq. glicerinae q.s. ut fiat bolus.
D.t.d. N4
S. Չիուևն՝ ներքին, օրական 2 անգամ, 1-ական բոլուս:
285. Rp.: Salis Carolini factitii 350.0

- Herbae Absinthii pulverati
Fructus Anisi pulverati aa 50.0
M.f. pulvis.
D.S. Չիուևն՝ ներքին, օրական 2 անգամ, 2 ճաշի գդալ:
286. Rp.: Olei Ricini 500.0
Aetheris aethylici 25.0
M.D.S. Չիուևն՝ ներքին, միանվագ, քթոնպանային
զոնդի միջոցով:
287. Rp.: Bismuthi subnitratris
Pancreathini aa 0.4
Ext. Belladonnae 0.01
M.f. pulvis.
D.t.d. N10
S. Շանը՝ ներքին, օրական 2 անգամ, 1-ական փոշի:
288. Rp.: Strychnini nitratris 0.01
Aq. destillatae 10.0
M.f. solutio. Sterilisetur!
D.S. Չիուևն՝ ենթամաշկային:
289. Rp.: Calomelanos 3.0
Natrii sulfatis 100.0
M.f. pulvis.
D.S. Չիուևն՝ ներքին: Խառնել 1 լիտր ջրի հետ
և խմեցնել զոնդով:

ԱՂԻՔՆԵՐԻ ԼՈՐՉԱԹԱՂԱՆԹԻ ՍՈՒՐ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ
ENTERITIS CATARRHALIS ACUTA
ОСТРЫЙ КАТАР КИШЕЧНИКА

Կենդանուն պետք է տալ հանգիստ և դյուրամարս, բարորակ կեր, որպեսզի զերծ մնան նոր բարդություններից:
Չիերին և տավարին կերակրել մանր խտով, չփոթով, որը կարելի է պատրաստել թեփից կամ ալյուրից: Սահմանափակել մանրացրած վարսակի քանակը:
Ուժեղ լուծի ժամանակ նշանակել լործեր: Շներին տալ շաքարաջուր

(200:1000), չոր հաց, մանրացրած միս, ացիդոֆիլային կաթ: Կերակրման հիմնական ռեժիմին անցումը պետք է կատարվի աստիճանաբար: Եթե փոփոխություն է նկատվել սրտի զործունեության հետ, ապա նշանակել սրտային դեղամիջոց: Կենդանուն տալ լուծողական դեղանյութեր, որից հետո տտիպ նյութեր ցավամոքիչ եւ հակամանրէնային:

290. Rp.: Natrii sulfatis 200.0
Aloes pulverati 10.0
M.D.S. Չիուն՝ ներքին, 2 լիտր ջրի հետ,
քթընկանային զոնդով:
291. Rp.: Tannalbini 15.0
Pulveris radices Gentianae 20.0
Pulveris radices Althaeae 10.0
M.f. pulvis.
D.t.d. N6
S. Չիուն՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական փոշի:
292. Rp.: Decocti corticis Quercus ex 40.0-400.0
Icthyoli 25.0
M.D.S. Չիուն՝ ներքին, մեկ ընդունման համար,
քթընկանային զոնդով:
293. Rp.: Colomelanos 4.0
Pulveris radices Althaeae et
Aq. fontanae q.s.
ut fiat bolus.
D.S. Չիուն՝ ներքին:
294. Rp.: Fenilii salicylatis
Tannalbini aa 10.0
M.f. pulvis.
D.t.d. N4
S. Չիուն՝ ներքին, օրական 2 անգամ,
1-ական փոշի, կերի հետ:
295. Rp.: Sol. Calcii chloridi 10% 10.0
D.t.d. N3
S. Չիուն՝ ներերակային, կաթիլային ամպուլա,
առավոտյան եւ երեկոյան:
296. Rp.: Sol. Glucosi 5% 500.0
D.S. Ներերակային, կաթիլային ներարկման համար:

297. Rp.: Sol. Polyglucini 400.0
D.t.d. N2 in flac.
S. Ներերակային, կաթիլային,
առավոտյան եւ երեկոյան:
298. Rp.: Plumbi acetici
Opii pulverati aa 5.0
Farinae secalinae et
Aq. fontanae q.s. ut fiat bolus.
D.t.d. N2
S. Չիուն՝ ներքին, օրական 1 բոլուս,
2 օրվա ընթացքում:
299. Rp.: Mentholi 0.01
Boli albi 1.0
Natrii hydrocarbonatis 0.3
M.f. pulvis.
D.t.d. N6
S. Շանը՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական փոշի:
300. Rp.: Opii pulverati 0.02
Tannalbini 0.4
Bismuthi subnitratris 0.25
Fenilii salicylatis 0.3
Sacchari albi 0.5
M.f. pulvis,
D.t.d. N8
S. Շանը՝ ներքին, օրական 2 անգամ, 1-ական փոշի,
4 օր անընդմեջ:
301. Rp.: Papaverini hydrochloridi 0.01
Extr. Belladonnae 0.015
Calcii carbonatis
Bismuthi subnitratris aa 0.5
M.f. pulvis,
D.t.d. N10
S. Շանը՝ ներքին, օրական 2 անգամ, 1-ական փոշի,
5 օր անընդմեջ:
302. Rp.: Solutionis Kalii hypermanganatis 1:5000 200.0
D.S. Շանը՝ ներքին, 1 ճաշի գդալով, օրական 3 անգամ,

303. Rp.: **Կերակրելուց առաջ:**
Boli albi 30.0
Aquae Menthae 200.0
M.D.S. Շանը՝ ներքին, օրական 2 անգամ, 1 ճաշի գդալ:
304. Rp.: Emuls. ol. Ricini 60.0
D.S. Շանը՝ ներքին, օրական 4-5 անգամ ճաշի գդալով, մինչև ազդեցության դրսևորումը:
305. Rp.: Osarsoli 0.25
D.t.d. N20 in tabl.
S. Հորթին՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 2-ական հաբ:

ԱՂԻՔՆԵՐԻ ՓՔԱԼՔ METEORISMUS INTESTINORUM ՄԵՏԵՕՐԻՅՄ ԿԻՇԵՇԻՈՒԿԱ

Բուժումը պետք է կատարվի շատ արագ ու նպատակասլաց տարվի գազերի գոյացման արգելակման եւ արագ դուրսբերման ուղղությամբ: Գազերի դուրսբերումը խթանելու նպատակով, կենդանուն անհրաժեշտ է ծածկել սառը ջրում թրջած շորի կտորով կամ ծածկոցով, հնարավորության դեպքում լողացնել:

Սրտի գործունեությունն ապահովելու նպատակով, ենթամաշկային եղանակով ներարկել կոֆեին: Գազերի հեռացումը խթանելու ինչպես նաև ստամոքսաղիքային ուղիներն ախտահանելու եւ խմորման պրոցեսները դադարեցնելու նպատակով անհրաժեշտ է (ներքին) տալ ֆորմալին, նաֆտալան եւ ցավազրկող դեղամիջոցներ:

306. Rp.: Aminazini 2.5% - 10ml
D.S. Չիուն՝ ներերակային, լուծել 100 մլ
40% ախտահանված գլյուկոզայի լուծույթի մեջ:
307. Rp.: Thymoli 8.0
Spiritus Vini rectificati 80.0
Aq. destillatae 200.0
M.D.S. Չիուն՝ ներքին, միանվազ:
308. Rp.: Ichthyoli 15.0
Aq. fontanae 500.0
M.D.S. Չիուն՝ ներքին:

309. Rp.: Chlorali hydrati 15.0
Sol. Natrii chloridi sterilisatae 5% 300.0
Spiritus Vini rectificati 30.0
M.D.S. Չիուն՝ ներերակային:
310. Rp.: Magnesii sulfatis 250.0
Aloes pulverati 15.0
Saponis viridis 10.0
M.D.S. Չիուն՝ ներքին, խառնել 1 լիտր ջրի հետ:
311. Rp.: Formalini 30.0
D.S. Չիուն՝ ներքին, խառնել 1 լիտր ջրի հետ:
312. Rp.: Benzonaphtoli 5.0
Farinae secalinae et
Aq. fontanae q.s.
ut fiat boli N2
D.S. Չիուն՝ ներքին, 1 օրվա ընթացքում:
313. Rp.: Sol. Magnesii sulfatis sterilisatae 10% 100.0
D.S. Չիուն՝ ներերակային, միանվազ:
314. Rp.: Coffeini-natrii benzoatis 5.0
Aq. destillatae 10.0
M.f. solutio steril.
D.S. Չիուն՝ ենթամաշկային:
315. Rp.: Coffeini-natrii benzoatis 3.0
Natrii chloridi 5.0
Glucosi 40.0
Aq. destillatae 200.0
M.f. sol. Sterilosatae
D.S. Չիուն՝ ներերակային, միանվազ:
316. Rp.: Pilocarpini hydrochloridi 0.1
Aq. destillatae sterilisatae 5.0
M.f. solutio
D.S. Չիուն՝ ենթամաշկային:
317. Rp.: Naphthalani 50.0
Saponis viridis 3.0
Aquae fontanae 500.0
M.D.S. Չիուն՝ ներքին:
318. Rp.: Sol. Analgini 50% 10.0

- Sterilisetur!
D.S. Ներերակային, միանվագ: Լուծել 50 մլ
1% ախտահանած նատրիումի քլորիդի լուծույթի մեջ:
319. Rp.: Sol. Chlorali hydrati sterill. 10% 100.0
D.S. Չիուն՝ ներերակային, միանվագ:
320. Rp.: Mentholi 1.0
Spiritus aethylici 100.0
Aq. fontanae 300.0
M.f. solutio.
D.S. Չիուն՝ ներքին, 1 անգամ ընդունման համար:
321. Rp.: Sol. Novocaini 0.25% 50.0
Sterilisetur!
D.S. Չիուն՝ ներերակային, միանվագ:
322. Rp.: Phnili salicylatis 10.0
Natrii hydrocarbonatis 20.0
M.f. pulvis
D.t.d. N9
S. Չիուն՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական փոշի:
Կարելի է պատրաստել բոլուս հացի խմորից:

ԿՈՊՐՈՍՏԱԶ ԵՎ ԽԻՄՈՍՏԱԶ COPROSTASIS-CHYMOSTASIS КОПРОСТАЗ И ХИМОСТАЗ

Բուժման ժամանակ անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել, որ հիվանդ կենդանին վայր չընկնի, չթավալվի եւ մեխանիկական վնասվածքներ չստանա: Աղիքների շարժումներին նպաստելու եւ կղկղանքը որոշ չափով փափկացնելու համար պետք է կատարել գոլ, իսկ երբեմն սառը ջրով հոգնաներ: Բացի այդ, կարելի է քթնայանային զոնդով 5-6 ժամվա ընթացքում տալ 20-30 լ ջուր: Կարելի է նշանակել նաեւ կտավատի, բամբակի, արեածաղկի եւ այլ ձեթեր: Պետք է պահպանել նաեւ սրտի գործունեությունը, սրկել կոֆեին, կամֆորա (ենթամաշկային):

323. Rp.: Olei Ricini 600.0
Paraffini Liquidi purissimi 1500.0

- Ichthyoli 60.0
M.D.S. Չիուն՝ ներքին, 3 անգամ ընդունելու համար, քթնայանային զոնդով:
324. Rp.: Aloes pulverati 30.0
Saponis viridis q.s. ut fiat bolus.
D.S. Չիուն՝ ներքին:
325. Rp.: Carbacholini 0.003
Aq. destillatae 3.0
M.f. solutio. Sterilisetur!
D.S. Չիուն՝ ենթամաշկային, ներարկել կոտորակային, աղիքների պարունակությունը փափկացնելուց հետո:
326. Rp.: Pilocarpini hydrochloridi 0.15
Aquae destillatae 4.0
M.f. solutio. Sterilisetur!
D.S. Չիուն՝ ենթամաշկային:
327. Rp.: Olei Ricini 750.0
D.S. Չիուն՝ ներքին, միանվագ, քթնայանային զոնդով:
328. Rp.: Sol. Magnesii sulfatis 33% 500.0
D.S. Շանը՝ բարակ ռետինե խողովակով ներմուծել ուղիղ աղիքի մեջ 100-150 մլ:
329. Rp.: Emulsi olei Ricini 30.0 : 800.0
D.S. Շանը՝ ներքին, 4-6 գդալ օրվա ընթացքում:
330. Rp.: Sol. Magnesii sulfatis 25% 80.0
Sterilisetur!
D.S. Չիուն՝ ներերակային:
331. Rp.: Sol. Natrii chloridi 10% 300.0
Coffeini-natrii benzoatis 3.0
M.f. sol. Sterilisata
D.S. Չիուն՝ ներերակային:

Կոպրոստազների ժամանակ լուծողականների եւ բուսական ձեթերի հետ չի խանգարի դարմամայրնատորի միջոցով ըստ Մելիքսեթյանի կամ Յելիչեւի ներմուծել մեծ քանակությամբ գոլ ջուր:

Սրտի գործունեությունը պահպանելու համար ենթամաշկային ներարկման ձեռով կարելի է նշանակել կոֆեինի լուծույթ:

332. Rp.: Olei Camphorae - 20.0
D.t.d. N3 in ampullis
S. Չիուն՝ ենթամաշկային, օրական 1 ամպուլ:
333. Rp.: Coffeini-natrii benzoatis - 4.0
Aquae destillatae - 10.0
M.f. solutio. Sterilisetur!
D.S. Չիուն՝ ենթամաշկային:
334. Rp.: Sol. Proserini 0.05% - 20.0
Sterilisetur!
D.S. Չիուն՝ ենթամաշկային, միանվագ:
335. Rp.: Olei Ricini - 50.0
D.S. Եանը՝ ներքին, միանվագ:

ՆՈՐԱԾԻՆ ՉՈՐԹԵՐԻ ԴԻՍՊԵՊՍԻԱ DIAREA ДИАРЕЯ НОВОРОЖДЕННОГО МОЛОДНЯКА

Առաջին հերթին նորածին կենդանիների համար ստեղծել նորմալ պայմաններ դալը կերակրելու, ինչպես նաև հետագա խնամքի համար:

Չիվանդ մատղաշ կենդանիներին պահել մորից զատ, սոված դիետայի՝ հորթերին 6-12 ժամ, գառներին եւ խոճկորներին՝ 4-6 ժամ, բայց պարտադիր բուրդին անհրաժեշտ է տալ զոլ ֆիզիոլոգիական, կամ նատրիումի քլորիդի 1%-անոց լուծույթ: Ընկալ արդյունք է տալիս օգտագործելով նաև երիցուկի ծաղիկներից ստացված ջրաթուրմը (բերանով), որը պատրաստվում է 1 կգ դեղաբույսին ավելացնելով 10 լ եռացրած ջուր: Չիվանդներին խնամում են խմբակային: Ջրաթուրմը տալիս են հորթերին եւ գառներին՝ օրական 2-3 անգամ՝ դալը կերակրելուց առաջ, 2-3 օրվա ընթացքում, հորթերին՝ 100-150 մլ, իսկ գառներին՝ 20-30 մլ:

Առաջարկվում է նաև նորածին հորթերին նշանակել ՉԱԽ (հեղուկ ա-ցեդոֆիլային խտանյութ) 2.0:

336. Rp.: Phenylis salicylatis 0.5
D.t.d. N6
S. Չորթին՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական փոշի, 1 բաժակ զոլ թեյի հետ:

337. Rp.: Besaloli 0.3
D.t.d. N6 in tabul.
S. Խոճկորին՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական հաբ, տրորել եւ խառնել կաթի հետ:
338. Rp.: Sol. Ichthyoli 0.5% 100.0
D.S. Գառանը՝ ներքին, 20 մլ առավոտյան եւ երեկոյան, խառնել 100 մլ եռացրած ջրին:
339. Rp.: Phenylis salicylatis 0.25
D.t.d. N9
S. Գառանը՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական փոշի, 3 օր անընդմեջ, խառնել 1 բաժակ զոլ թեյի հետ:
340. Rp.: Synthomycini 0.5
D.t.d. N12
S. Չորթին՝ ներքին, օրական 3 անգամ 1 հաբ, 4 օր անընդմեջ, խմեցնել զոլ խեժի հետ:
341. Rp.: Laevomycetini 0.05
D.t.d. N12 in tabule.
S. Խոճկորին՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական հաբ, դալի հետ, 4 օր անընդմեջ:
342. Rp.: Chlortetraciclina hydrochloridi 0.1
D.t.d. N12
S. Գառանը՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական փոշի, 4 օր անընդմեջ:
343. Rp.: Tetracyclini 0.5
D.t.d. N12
S. Գառանը՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական փոշի, 4 օր անընդմեջ:
344. Rp.: Monomycini 0.25
D.t.d. N9
S. Չորթին՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական փոշի, խառնել 1 բաժակ թեյի հետ, 5 օրվա ընթացքում:
345. Rp.: Tabul. Becaboni N12
S. Չորթին՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական հաբ, 4 օր անընդմեջ, զոլ կաթի հետ:
346. Rp.: Colimycini 0.3
D.t.d. N12

347. Rp.: S. Գորթին՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական փոշի:
Neomycini sulfatis 0.05
D.t.d. N12
348. Rp.: S. Գորթին՝ ներքին, օրական 3 անգամ,
1-ական փոշի, գոլ ջրի հետ, 4 օր անընդմեջ:
Polymyxini M-sulfatis 100000 միավոր
D.t.d. N6
349. Rp.: S. Գառանը՝ ներքին, օրական 3 անգամ:
Oxytetracyclini hydrochloridi 0.4
D.t.d. N12
350. Rp.: S. Գորթին՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական փոշի,
գոլ ջրի հետ, 4 օր անընդմեջ:
Sulginini 0.5
D.t.d. N12
351. Rp.: S. Գորթին՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական փոշի,
4 օր անընդմեջ:
Phthalazoli 0.2
D.t.d. N12
352. Rp.: S. Գառին՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական փոշի,
4 օր անընդմեջ:
«Նարինե» 25 մլ առավոտյան
Oxytetracyclini 1.0
D.S. Գորթին՝ երեկոյան, օրական 1 անգամ:
353. Rp.: Sulfadimezini 0.1
D.t.d. N12
354. Rp.: S. Խոճկորին՝ ներքին, օրական 3 անգամ,
1-ական փոշի, 4 օր անընդմեջ, գոլ կաթի հետ:
Aethazoli 0.5
D.t.d. N12
355. Rp.: S. Գորթին՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական փոշի,
4 օր անընդմեջ, տալ 1 բաժակ գոլ ջրի հետ:
Norsulfazoli 0.3
D.t.d. N12
356. Rp.: S. Գառանը՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական փոշի,
4 օր անընդմեջ:
Sulfadimezini 0.5

- D.t.d. N12
357. Rp.: S. Գորթին՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական փոշի,
3 օր անընդմեջ:
Furadonini 0.1
D.t.d. N9
358. Rp.: S. Գորթին՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական փոշի,
լուծել գոլ ջրի մեջ, 3 օր անընդմեջ:
Furacilini 0.1
D.t.d. N9
359. Rp.: S. Գորթին՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական փոշի,
3 օր անընդմեջ: Լուծել գոլ ջրի մեջ:
Furazolidoni 0.03
D.t.d. N9
360. Rp.: S. Գորթին՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական փոշի,
3 օր անընդմեջ: Տալ 500 մլ եռացրած ջրի հետ,
դալով կերակրելուց առաջ:
Sulfapyridazini 0.5
D.t.d. N6
361. Rp.: S. Գառանը՝ ներքին, օրական 1 անգամ, 1-ական հար:
Sol. Norsulfazol natrii 0.2% - 2000 ml
D.S. Գառանը՝ ներքին, խմեցնել օրական 200 մլ
8-9 օր անընդմեջ:
362. Rp.: Monomycini 0.1
D.t.d. N9
363. Rp.: S. Խոճկորին՝ ներքին, օրական 3 անգամ,
1-ական փոշի,
3 օր անընդմեջ, գոլ կաթի հետ:
Laevomycefini 0.3
D.t.d. N12
364. Rp.: S. Գորթին՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական փոշի,
4 օր անընդմեջ:
Aethazoli 0.1
D.t.d. N9
- S. Խոճկորին՝ ներքին, օրական 3 անգամ,
1-ական փոշի:
Տալ 1 բաժակ գոլ թեյի կամ գոլ ջրի հետ,

365. Rp.: դալը տալուց առաջ:
Norsulfazoli 0.5
D.t.d. N9
S. Գորթին՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական փոշի:
366. Rp.: Tetracyclini 0.4
D.t.d. N12
S. Գորթին՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական փոշի:
Տալ 1 բաժակ զոլ թեյի հետ՝ դալով կերակրելուց առաջ:

ԼԵՂԱԾՈՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԼԵՂԱՊԱՐԿԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ

CHOLANGITIS ET CHOLECYSTITIS

ВОСПАЛЕНИЕ ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ И ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

Այս հիվանդությունները ընթանում են միասին եւ երբ ասում են խոլանգիտ կամ խոլեցիստիտ, նկատի ունեն այն, թե որն է ավելի ցայտուն արտահայտված: Պահանջվում է բարելավել կենդանիների կերակրումը եւ զոոհիգիենիկ պայմանները: Ցավերի դեպքում պետք է նշանակել անիլումի թուրմ, անալգին, բացի այդ կատարել հոգնաներ՝ քլորալհիդրատով, ինչպես նաեւ պետք է նշանակել սրտի աշխատանքը խթանող պատրաստուկներ՝ կոֆեին, կամֆորա: Միաժամանակ անհրաժեշտ է ախտահանել լեղածորանները եւ տալ լեղամուղ պատրաստուկներ: Լյարդի հատվածին դնել տաք փաթաթաններ:

367. Rp.: Hexamethylentetramini 5.0
Fenilii salicylatis 15.0
M.f. pulvis
D.t.d. N8
S. Կովին՝ ներքին, օրական 2 անգամ, 1-ական փոշի:
368. Rp.: Acidi dehydrocholici 5.0
D.t.d. N9
S. Կովին՝ ներքին, օրական 3 անգամ:
369. Rp.: Allochohli 0.3
D.t.d. N12

370. Rp.: S. Շանը՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական հաբ:
Cholenzymi 0.3
D.t.d. N12 tab.
S. Շանը՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1-ական հաբ, կերակրելուց առաջ:
371. Rp.: Pulveris rhizomatis Rhei 40.0
Sal. Carolini factitii 400.0
M.f. pulvis
D.S. Չիուն՝ ներքին, օրական 1 ճաշի գդալ, կերակրելուց առաջ:
372. Rp.: Natrii benzoatis 0.5
Sacchari albi 0.6
M.f. pulvis
D.t.d. N8
S. Շանը՝ ներքին, օրական 2 անգամ, 1-ական փոշի:
373. Rp.: Salis Carolini factitii 300.0
D.S. Չիուն՝ ներքին, 10 անգամ ընդունման համար, օրվա ընթացքում 2 անգամ, 30.0
374. Rp.: Chologoli 25.0
in flaconis
D.t.d. N2
S. Շանը՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 5-ական կաթիլ շաքարի հետ:
375. Rp.: Fenilii salicylatis 0.5
Extracti Belladonnae 0.015
Sacchari albi 0.5
M.f. pulvis
D.t.d. N10
S. Շանը՝ ներքին, օրական 2 անգամ, 1-ական փոշի:
376. Rp.: Natrii sulfatis 220.0
Natrii hydrocarbonatis 100.0
Natrii chloridi 90.0
Kalii sulfatis 10.0
M.D.S. Չիուն՝ ներքին, 1 ճաշի գդալ, օրական մի քանի անգամ կերակրելուց առաջ:

377. Rp.: Fenilli salicylatis 15.0
Farinae secalinae et
Aquae fontanae aa q.s. ut fiat bolus.
D.t.d. N6
S. Չիուն ներքին, օրական 2 անգամ, 1-ական քոլուս:
378. Rp.: Cholosasi 200.0
D.S. Շանը՝ ներքին, օրական 3 անգամ,
1-ական ճաշի գդալ շաքարի հետ:

ԼՅԱՐԴԻ ՍՈՒՐ ՊԱՐԵՆԽԻՄԱՏՈՉԱՅԻՆ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ
HEPATITIS PARENCHYMATOSA ACUTA
ОСТРОЕ ПАРЕНХИМАТОЗНОЕ
ВОСПАЛЕНИЕ ПЕЧЕНИ

Անհրաժեշտ է բարելավել զոոիգիենիկ պայմանները, տալ փափուկ և դյուրամարս կեր: Սահմանափակել ջուրը: Կենդանուն տալ ածխաջրատներով հարուստ կեր՝ ճակնդեղ, զանազան արմատապալարապտուղներ և այլն: Խուսափել խմորվող սպիտակուցներով ու ճարպերով հարուստ կերերից:

Նշանակել հեքսամեթիլենտետրամին և գլյուկոզա: Ցավերը հանգստացնելու և մեղմացնելու նպատակով նշանակել ցավազրկող պատրաստուկներ:

379. Rp.: Pulveris rhizomatis Rhei
Pulveris radices Gentianae aa 20.0
Salis Carolini factitii 500.0
M.D.S. Տավարին՝ ներքին,
օրական 3 անգամ, 2 ճաշի գդալ:
380. Rp.: Aloes pulverati 30.0
Sal. Carolini factitii 300.0
Pul. rad. Althaeae et
Aq. fontanae q.s. ut fiat boli N4
D.S. Տավարին՝ ներքին, օրական 1-ական քոլուս:
381. Rp.: Fenilli salicylatis 15.0
Farinae secalinae et

- Aquae fontanae q.s.
ut fiat massae bolorum
D.t.d. N6
S. Չիուն ներքին, օրական 2 անգամ, 1-ական քոլուս:
382. Rp.: Salis Carolini factitii 15.0
Sirupi simplicis 20.0
Aq. destillatae 200.0
M.D.S. Շանը՝ ներքին, 1 ճաշի գդալ,
օրական 2-3 անգամ:
383. Rp.: Emetini hydrochloridi 0.02
Aquae destillatae 3.0
M.f. solutio. Sterilisetur!
D.S. Շանը՝ ենթամաշկային:
384. Rp.: Pilocarpini hydrochloridi 0.2
Aquae destillatae 5.0
M.f. solutio. Sterilisetur!
D.S. Տավարին՝ ենթամաշկային:
385. Rp.: Sol. Glucosi 20% 300.0
Acidi ascorbinici 0.2
M.f. solutio steril.
D.S. Տավարին՝ ներերակային: Կրկնել 3 օր:
386. Rp.: Sol. Carolini factitii 500.0
D.S. Չիուն ներքին, տալ 30.0 առավոտյան և երեկոյան
առվույտի հետ:
387. Rp.: Hexamethylentetramini 1.0
Natrii salicylatis 10.0
M.f. pulvis
D.t.d. N6
S. Ոչխարին՝ ներքին, օրական 2 անգամ, 2՝ական,
1-ական փոշի, 3 օր:
388. Rp.: Sol. Chologoli 5% 10.0
in ampullis
D.t.d. N5
S. Շանը ներերակային, օրական 1 անգամ,
5-10 մլ, 3-4 օր: Սրսկումը կարելի է կրկնել
3 օր ընդմիջումից հետո:

389. Rp.: Fenilii salicylatis 0.5
 Ex. Belladonnae 0.015
 Sacchari albi 0.5
 M.f. pulvis
 D.t.d. N10
 S. Շանը՝ ներքին, օրական 2 անգամ, 1-ական փոշի:

**ԼՅԱՐԴԻ ՏՈՔՍԻԿ ԴԻՍՏՐՈՖԻԱ
 DYSTROPHIA HEPATIS TOXICA (HEPATOSIS)
 ТОКСИЧЕСКАЯ ДИСТРОФИЯ ПЕЧЕНИ (ГЕПАТОЗ)**

Կերաբաժնից հանել այն կերը, որը կարող է թունավորման կասկած հարուցել: Նշանակել դյուրամարս կեր: Խոտակերերին եւ ամենակերերին տալ խոտի ալյուր, խոտ եւ արմատապալարապտուղներ:

Լվանալ կասկածելի հիվանդների կտրիչը եւ ստամոքսը, կատարել են խոր մաքրող հոգնաներ եւ տալ լուծողական (ներքին): Թունավոր նյութերը անվտանգ դարձնելու համար տալ կաթ, ակտիվացրած ածուխ կամ կլանող:

Կարելի է նշանակել նաեւ լեղամուղ նյութեր: Թունավորման նշանների զարգացման դեպքում նշանակել սրտային դեղամիջոցներ եւ վիտամիններ:

390. Rp.: Paracetamoli - 0.25
 D.t.d. N20 in talubul.
 S. Ներքին օրական 3 անգամ, 1-ական հաբ, 7 օր անընդմեջ:
391. Rp.: Sol. Natrii sulfatis 2% - 4000.0
 D.S. Չիուն՝ ներքին, զոնդի միջոցով,
 գոլ վիճակում 2 անգամ ընդունման համար,
 4 ժամ ընդմիջումով:
392. Rp.: Olei Ricini - 50.0
 D.S. Խոճկորին՝ ներքին, միանվագ, գոլ վիճակում:
393. Rp.: Magnesii oxydi - 10.0
 Natrii sulfatis - 150.0
 M.D.S. Չորթին՝ ներքին:
 Կտրիչը լվանալուց հետո միանվագ տալ գոլ ջրով:
394. Rp.: Carbonis activati - 50.0
 D.S. Խոճկորին՝ ներքին, գոլ ջրի հետ 500 մլ, միանվագ:

- Լախտրականք ստամոքսը լվանալուց հետո:
395. Rp.: Glucosi 40% 10.0
 D.t.d. N10 in ampullis
 S. Շանը՝ ներերակային, օրական 10 մլ,
 10 օր անընդմեջ:
396. Rp.: Sol. Glucosi 20% 900.0
 Acidi ascorbinici 3.0
 M.f. sol. steril.
 D.S. Տավարին՝ ներերակային, օրական 1 անգամ,
 300 մլ, 3 օր անընդմեջ:
397. Rp.: Camphorae tritae 1.0
 Glucosi 15.0
 Spiritus aethylici 75.0
 Aq. destillatae 250.0
398. Rp.: Oxaphenamidi 0.25
 D.t.d. N30 tabul
 S. Շանը՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 0.5 հաբ,
 կեր տալուց հետո:
399. Rp.: Sol. Pyridoxini hydrochloridi 1% - 1.0
 D.t.d N30 in ampullis
 S. Մտրուկին՝ օրական 1-ական անվուլ,
 ենթամաշկային, մեկ ամսվա ընթացքում:
400. Rp.: Sol. Glucosi 40% 300.0
 Sol. Novocaini 0.25% 50.0
 M.f. sol. Steril.
 D.S. Չիուն՝ ներերակային, միանվագ:
401. Rp.: Methionini 2.0
 D.t.d. N30
 S. Չորթին՝ ներքին, օրական 2 անգամ,
 1-ական փոշի, կերի հետ, 15 օր:
402. Rp.: Calcii pangamatis 0.05
 D.t.d. N50
 S. Խոճկորին՝ ներքին, օրական 2 անգամ,
 2-ական փոշի, կերի հետ:
403. Rp.: Natrii iodati 2.0
 D.t.d. 10

404. Rp.: S. Գորթին՝ ներքին, օրական 2 անգամ, 1-ական փոշի, կաթի հետ:
Acidi dehydrocholoni 0.2
D.t.d. N20 in tabul.
S. Խոճկորին՝ ներքին, օրական 2 անգամ, 2 հաբ, կաթի հետ:
405. Rp.: Chlorosasi 150.0
D.S. Շանը՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 1 թեյի գդալով, կաթի հետ, 7 օր անընդմեջ:

ՈՐՈՎԱՅՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ՋՐԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
HYDROPS ABDOMINIS. ASCITES
БРЮШНАЯ ВОДЯНКА

Հատուկ բուժում չի մշակված: Անհրաժեշտ է հայտնաբերել պատճառը եւ այն վերացնել: Առավել չափով պակասեցնել ջուրը: Եթե տրանսուրատը կուտակվել է մեծ չափով, ապա այն հեռացնել տրոսկարով: Նշանակում են ներքոհիշյալ դեղանյութերը:

406. Rp.: Pulveris fol. Digitalis 0.1
Calcii chloridi 0.3
Boius albae q.s. ut fiat pilula,
D.t.d. N10
S. Շանը՝ ներքին, օրական 2 անգամ, 1-ական պիլուլ:
407. Rp.: Kalii acetatis 15.0
Aq. destillatae 200.0
M.D.S. Շանը՝ ներքին, 1 ճաշի գդալ, 2-3 ժամը մեկ:
408. Rp.: Pulveris fol. Digitalis 0.03
Diuretini 0.3
M.f. pulvis.
D.t.d. N9
S. Շանը՝ ներքին, օրական 2 անգամ, 1-ական փոշի:
409. Rp.: Mercusali 1.0
D.t.d. N4 in ampullis
S. Շանը՝ ներմկանային, օրական 1 մլ:
410. Rp.: Themisali 0.3

- D.t.d. N24
S. Շանը՝ ներքին, օրական 1 փոշի, 3 անգամ, 8 օր անընդմեջ:
411. Rp.: Adonisidi 1.0
D.t.d. N10 in ampullis
S. Շանը՝ ենթամաշկային, օրական 1 ամպուլ:
412. Rp.: T-rae Convallariae 25.0
D.S. Խոճկորին՝ ներքին, օրական 20 կաթիլ, առավոտյան եւ երեկոյան, 5 օր անընդմեջ:
413. Rp.: Sol. Digoxini 0.025% 1.0
Sol. Glucosi 5% 20.0
Sterilisetur!
M.D.S. Շանը՝ ներերակային, դանդաղ, 1 անգամ ներարկելու համար:
414. Rp.: Infusi Adonidis vernalis 5.0 100.0
D.S. Շանը՝ ներքին, 1 ճաշի գդալ, 2 ժամը մեկ:
415. Rp.: Theobromini 2.0
D.t.d. N10
S. Չիուն՝ ներքին, օրական 2 անգամ, 1-ական փոշի, կեփի հետ:
416. Rp.: Sol. Calcii chloridi 10% 10.0 in ampullis
D.S. Մտրուկին՝ ներերակային, միանվագ:

ՈՐՈՎԱՅՆԱՄԻՉԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ
PERITONITIS
ПЕРИТОНИТ

Բուժումը սինսպտոմատիկ է: Հիվանդ անասուններին պետք է ազատել աշխատանքից, տալ դյուրամարս, փափուկ, չխմորվող կեր, բարելավել գոտիդիեթիկ պայմանները եւ խնամքը:

417. Rp.: Decocti corticis Guercus ex 45 - 500.0
Infusi rhizomatis Valerianae ex 40 - 400.0
M.D.S. Չիուն՝ ներքին, օրական 2 անգամ ըղունման համար, ռետինե շշով:
418. Rp.: Salis Carolini factitii 300.0
D.S. Չիուն՝ ներքին, 4 անգամ ընդունման համար:

419. Rp.: օրվա ընթացքում, կերի հետ:
Opii pulverati 10.0
Hydrargyri chloridi 3.0
Pul. rad. Althaeae et
Aq. glycerinatae q.s.
ut fiat bolus.
 D.t.d. N6
 S. Չիուն՝ ներքին, օրական 2 անգամ, 1-ական բոլուս:
420. Rp.: *Phenilii salicylatis*
Tannalbinii aa 10.0
Pul. rad. Liquiritiae et
Aq. fontanae q.s.
ut fiat bolus.
 D.t.d. N6
 S. Շանը՝ ներքին, օրական 2 անգամ, 1-ական բոլուս:
421. Rp.: *Sol. Adrenalini hydrochloridi* 0.1% - 1.0
Sol. Natrii chloridi steril. 0.85% - 1500.0
 M.D. *in vitro nigro.*
 S. Չիուն՝ ներերակային, միանվագ:
422. Rp.: *Tincturae Opii simplicis* 5.0
 D.S. Շանը՝ ներքին, օրական 3 անգամ, 5-10 կաթիլ:
423. Rp.: *Infusi folii Sennae* 150.0
Magnesii sulfatis 20.0
Sirupi simplicis 25.0
 M.D.S. Շանը՝ ներքին, ճաշի գդալով,
 2 ժամը մեկ անգամ:
424. Rp.: *Sol. Calcii chloridi* 10% 5.0
 D.t.d. N2 *in ampullis*
 S. Շանը՝ ներերակային, կաթիլային, 1 ամպուլ,
 առավոտյան եւ երեկոյան:
425. Rp.: *Phenilii salicylatis*
Tannalbinii aa 0.3
Extr. Belladonnae 0.015
 M.f. *pulvis*
 D.t.d. N8
 S. Շանը՝ ներքին, օրական 2 անգամ, 1-ական փոշի:
426. Rp.: *Penicillini* 0.15

427. Rp.: *Streptomycini* 0.5
Novocaini 0.15
Aq. destillatae sterilisatae 200.0
 D.S. Ներարկել որովայնի խոռոչի մեջ:
428. Rp.: *Olei Terebinthinae* 60.0
Olei Hyoscyami 50.0
Olei Lini 150.0
 M.f. *Linimentum*
 D.S. Արտաքին, շփել որովայնի պատը:
429. Rp.: *Tetracyclini hydrochloridi*
Oleandomycini phosphas aa - 0.1
Neomycini 50000 AM
 M.f. *pulvis*
 D.t.d. N6
 S. Հորթին՝ ներքին, օրական 2 անգամ, 1-ական փոշի:
430. Rp.: *Cifrani* 100.0
 D.t.d. N10 *in flac.*
 S. Ներերակային (կաթիլային), 100 մլն,
 օրական 2 անգամ:
431. Rp.: *Fortumi* 1.0
 D.t.d. N7 *in flac.*
 S. Շանը՝ ներերակային, դանդաղ, օրական 0.5 գ,
 2 անգամ, 5 օր անընդմեջ:
432. Rp.: *Benzylpenicillini* 900000 AM
 D.t.d. N6 *in ampullis*
 S. Չիուն՝ ներմկանային: Մեկ ամպուլի մեջ լցնել
 5 մլ 0.5%-ոց
 նովկայինի լուծույթ եւ ներարկել օրական 2 անգամ:
433. Rp.: *Oleandomycini phosphatis* 2.5
Sol. Glucosi steril 2000 ml
 M.f. *solutio ex temporae*
 D.S. Չիուն՝ ներերակային, օրական 1 անգամ:
433. Rp.: *Fortumi* 1.0
 D.t.d. N7 *in flac.*
 S. Ներերակային, դանդաղ ներմուծել 0.5,
 օրական 3 անգամ, 5 օր անընդմեջ:
 Լուծել 4 մլ ճաւորիումի քլորի լուծույթի մեջ:

434. Rp.: Cefobidi 1.0
D.t.d. N10 in flac.
S. Ներմկանային, 2 մլ իզոտոնիկ նատրիի քլորի լուծույթի մեջ, 12 ժամը մեկ:
435. Rp.: Norsulfazoli-natrii 12.0
Spiritus aethylici 100.0
Glucosi 40.0
Aq. destillatae 200.0
M.f. solutio. Sterilisata!
D.S. Չիուն ներերակային, միանվագ:
436. Rp.: Norsulfazoli solubilis 60.0
Sol. Calci chloridi 10% - 1800 ml
M.f. solutio. Sterilisetur!
D.S. Տավարին ներերակային, օրական 2 անգամ 300 մլ:
437. Rp.: Benzylpenicillini-natrii
Streptomycini aa 100000 AM
D.t.d. N5
S. Ոչխարին՝ ներմկանային, օրական 1 անգամ:
Լուծել 10 մլ ֆիզիոլոգիական լուծույթի մեջ եւ ներարկել 5 օր անընդմեջ:
438. Rp.: Bicillini-5 1000000 AM
D.t.d. N2 in flac.
S. Ոչխարին՝ ներմկանային: Լուծել 5 մլ ֆիզիոլոգիական լուծույթի մեջ եւ ներարկել 5 օրական 1 անգամ:
439. Rp.: Penicillini crystallisati pro injectionae 200000 AM
D.t.d. N10
S. Գորթին՝ ներմկանային, ներարկել 0.25%-ոց նովոկայինի ախտահանված լուծույթի հետ 200000 AM, օրական 3 անգամ:
440. Rp.: Benzylpenicillini-novocaini 1000000 AM
D.t.d. N6
S. Գորթին՝ ներմկանային, օրական 2 անգամ, 1 մլ միավոր ամպուլի մեջ ավելացնել 3 մլ ախտահանված ֆիզիոլոգիական լուծույթ:

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի բորբոքում 8
Ըմպանի բորբոքում 10
Կերակրափողի բորբոքում 13
Կերակրափողի ջղաձգություն 14
Կերակրափողի պարալիչ 15
Կերակրափողի խցանում 16
Նախաստամոքսների հիպոտոնիա 17
Կտրիչի գերլցում 19
Կտրիչի փքանք 21
Կտրիչի պարակերատոզ 23
Տրավմատիկ ռետիկուլիտ եվ ռետիկուլոպերիտոնիտ 25
Գրքի խցանում 27
Ստամոքսի լորձաթաղանթի կատարային խրոնիկ բորբոքում 28
Ստամոքսի կատարային սուր բորբոքում 29
Ստամոքսի սուր լայնացում 32
Ստամոքսի խոց 34
Շների ստամոքսի խոցային հիվանդություն 36
Ստամոքսի եւ աղիքների բորբոքում 38
Բարակ եւ հաստ աղիքների լորձաթաղանթի բորբոքում 40
Աղիքների ջղաձիգ կծկումներ 42
Աղիքների խրոնիկ կատա 44
Աղիքների լորձաթաղանթի սուր բորբոքում 45
Աղիքների փքանք 48
Կոպրոստազ եւ խիմոստազ 50
Նորածին հորթերի դիսպեպսիա 52
Լեղաձորանների եւ լեղապարկի բորբոքում 56
Լյարդի սուր պարենխիմատոզային բորբոքում 58
Լյարդի տրքսիկ դիստրոֆիա 60
Որովայնի խոռոչի ջրզողություն 62
Որովայնամիզի բորբոքում 63

Վ. Մ. ՍԱՅՐԱՋԲԵԿՅԱՆ

Ա.Վ. ՄԱՆԱՍՅԱՆ

ԴԵՂԱՏՈՍՍԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ

Գյուղատնտեսական կենդանիների
մարսողական համակարգի
ուչ վարակիչ հիվանդությունների բուժման
ղեղատոմսեր

*ՀԳԱ անասնաբուժական բժշկագիտության
ֆակուլտետի ուսանողների համար*

ԵՐԵՎԱՆ-2003

Թուղթ՝ օվսեթ: Չափը՝ 60x84 1/16: Ծավալը՝ 4,25 տպ. մամուլ:
Տպաքանակը՝ 300 օրինակ:
Տպագրվել է «ՍԱՐՎԱՐԴ ԲՐԱՏ» ՍՊԸ տպարանում: